Study	logOR [95%CI]	P-value
Miao.1, Kidney, n = 28	−3.37 [−6.02; −0.72]	0.01
Fumet.2, Lung, n = 41	−1.51 [−3.31; 0.29]	0.10
Van_Allen, Melanoma, n = 39	−0.77 [−3.00; 1.46]	0.50
Riaz, Melanoma, n = 33	−0.68 [−2.62; 1.26]	0.49
Braun, Kidney, n = 139	−0.53 [−1.47; 0.41]	0.27
Liu, Melanoma, n = 112	−0.33 [−1.35; 0.69]	0.53
Nathanson, Melanoma, n = 24	−0.01 [−2.32; 2.30]	0.99
Mariathasan, Kidney, n = 46	0.06 [−1.86; 1.98]	0.95
Fumet.1, Lung, n = 39	0.07 [−1.64; 1.78]	0.94
Mariathasan, Bladder, n = 133	0.43 [−0.37; 1.23]	0.30
Jung, Lung, n = 26	0.62 [−1.61; 2.85]	0.59
Snyder, Ureteral, n = 22	1.26 [−0.66; 3.18]	0.20
Hugo, Melanoma, n = 27	3.41 [0.72; 6.10]	0.01
Total	−0.11 [−0.61; 0.38]	

Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 20.53$ ($P = .06$), $I^2 = 42\%$ [0%; 70%]

Test for overall effect: $z = −0.45$ ($P = .65$)

Estimated logOR