Study	logOR [95%CI]	P-value
Jung, Lung, n = 26	−3.40 [−6.32; −0.48]	0.02
Fumet.2, Lung, n = 41	−1.94 [−3.82; −0.06]	0.04
Van_Allen, Melanoma, n = 39	−0.90 [−2.55; 0.75]	0.28
Riaz, Melanoma, n = 33	−0.89 [−2.24; 0.46]	0.20
Mariathasan, Bladder, n = 133	−0.85 [−1.61; −0.09]	0.03
Liu, Melanoma, n = 112	−0.62 [−1.40; 0.16]	0.13
Fumet.1, Lung, n = 39	−0.51 [−2.27; 1.25]	0.57
Snyder, Ureteral, n = 22	−0.34 [−2.40; 1.72]	0.75
Mariathasan, Kidney, n = 46	−0.27 [−1.78; 1.24]	0.73
Braun, Kidney, n = 139	−0.25 [−1.05; 0.55]	0.54
Hugo, Melanoma, n = 27	0.16 [−1.47; 1.79]	0.85
Miao.1, Kidney, n = 28	0.52 [−1.24; 2.28]	0.56
Total	−0.60 [−0.96; −0.25]	

Heterogeneity: $\chi^2_{11} = 9.57$ ($P = .57$), $I^2 = 0\%$ [0%; 58%]

Test for overall effect: $z = -3.31$ ($P < .001$)

Estimated logOR