Study	logHR [95%CI]	P−value
Riaz, Melanoma, n = 51	−1.00 [−2.06; 0.06]	0.06
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	−0.46 [−2.28; 1.36]	0.62
Snyder, Ureteral, n = 25	−0.31 [−1.56; 0.94]	0.62
Liu, Melanoma, n = 121	−0.30 [−1.04; 0.44]	0.44
Mariathasan, Kidney, n = 67	−0.27 [−1.13; 0.59]	0.53
Miao.1, Kidney, n = 33	−0.25 [−1.15; 0.65]	0.58
Nathanson, Melanoma, n = 24	−0.21 [−1.78; 1.36]	0.79
Braun, Kidney, n = 178	−0.16 [−0.67; 0.35]	0.55
Mariathasan, Bladder, n = 194	−0.08 [−0.57; 0.41]	0.74
Hugo, Melanoma, n = 27	0.27 [−1.26; 1.80]	0.73
Fumet.2, Lung, n = 43	0.49 [−0.65; 1.63]	0.40
Van_Allen, Melanoma, n = 42	0.64 [−0.54; 1.82]	0.29
Mariathasan, Ureteral, n = 26	3.00 [1.18; 4.82]	0.00
Total	−0.10 [−0.34; 0.15]	

Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 17.54$ ($P = .13$), $I^2 = 32\%$ [0%; 65%]

Test for overall effect: $z = -0.77$ ($P = .44$)

logHR estimate