| Source | (95% CI) | |
|---|---|---|
| **Primary = Other** | | |
| Samstein, Esophagus, n = 21 | −1.00 [−2.27; 0.27] | |
| Samstein, HNC, n = 78 | −0.50 [−1.21; 0.21] | |
| Rizvi.18, Lung, n = 29 | −0.37 [−1.25; 0.51] | |
| Snyder, Ureteral, n = 25 | −0.35 [−1.47; 0.77] | |
| Samstein, Unknown, n = 34 | −0.30 [−1.18; 0.58] | |
| Total | −0.46 [−0.87; −0.05] | |

Heterogeneity: $\chi^2_4 = 0.91$ ($P = .92$), $I^2 = 0\%$ [0%; 79%]

| | | |
|---|---|---|
| **Primary = Melanoma** | | |
| Samstein, n = 132 | −0.75 [−1.24; −0.26] | |
| Liu, n = 144 | −0.34 [−0.81; 0.13] | |
| Van_Allen, n = 112 | −0.08 [−0.59; 0.43] | |
| Miao.2, n = 38 | 1.03 [−0.48; 2.54] | |
| Total | −0.30 [−0.72; 0.12] | |

Heterogeneity: $\chi^2_3 = 6.85$ ($P = .08$), $I^2 = 56\%$ [0%; 85%]

| | | |
|---|---|---|
| Total | −0.38 [−0.62; −0.15] | |

Heterogeneity: $\chi^2_8 = 7.96$ ($P = .44$), $I^2 = 0\%$ [0%; 65%]

Test for overall effect: $z = -3.20$ ($P = .001$)

Test for subgroup differences: $\chi^2_1 = 0.30$ ($P = .58$)

−1.5 −0.5 0.5 1 1.5

logHR estimate