Source	(95% CI)
Primary = Kidney	
Miao.1, n = 33	−0.60 [−1.44; 0.24]
Mariathasan, n = 67	−0.19 [−0.76; 0.38]
Braun, n = 178	0.46 [0.07; 0.85]
Total	−0.03 [−0.64; 0.58]

Heterogeneity: $\chi^2_2 = 6.82$ ($P = .03$), $I^2 = 71\%$ [0%; 91%]

Primary = Other	
Mariathasan, Ureteral, n = 26	−0.40 [−1.36; 0.56]
Fumet.2, Lung, n = 43	−0.13 [−0.91; 0.65]
Mariathasan, Bladder, n = 194	0.12 [−0.23; 0.47]
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	0.36 [−0.56; 1.28]
Snyder, Ureteral, n = 25	0.67 [−0.31; 1.65]
Total	0.11 [−0.17; 0.39]

Heterogeneity: $\chi^2_4 = 2.98$ ($P = .56$), $I^2 = 0\%$ [0%; 79%]

Primary = Melanoma	
Liu, n = 121	−0.21 [−0.72; 0.30]
Nathanson, n = 24	−0.11 [−1.13; 0.91]
Riaz, n = 51	0.42 [−0.27; 1.11]
Hugo, n = 27	0.53 [−0.63; 1.69]
Van_Allen, n = 42	0.53 [−0.21; 1.27]
Total	0.17 [−0.21; 0.55]

Heterogeneity: $\chi^2_4 = 4.17$ ($P = .38$), $I^2 = 4\%$ [0%; 80%]

Total	0.12 [−0.08; 0.32]

Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 14.00$ ($P = .30$), $I^2 = 14\%$ [0%; 53%]

Test for overall effect: $z = 1.15$ ($P = .25$)

Test for subgroup differences: $\chi^2_2 = 0.30$ ($P = .86$)

−1 −0.5 0 0.5 1

logHR estimate