| Study | logHR [95%CI] | P–value |
|---|---|---|
| Nathanson, Melanoma, n = 24 | −1.36 [−2.46; −0.26] | 0.01 |
| Van_Allen, Melanoma, n = 42 | −1.10 [−1.88; −0.32] | 0.01 |
| Mariathasan, Lymph_node, n = 26 | −0.89 [−1.85; 0.07] | 0.07 |
| Snyder, Ureteral, n = 25 | −0.83 [−1.81; 0.15] | 0.10 |
| Liu, Melanoma, n = 121 | −0.70 [−1.21; −0.19] | 0.01 |
| Riaz, Melanoma, n = 51 | −0.65 [−1.34; 0.04] | 0.07 |
| Mariathasan, Bladder, n = 194 | −0.61 [−0.96; −0.26] | 0.00 |
| Mariathasan, Kidney, n = 67 | −0.46 [−1.05; 0.13] | 0.12 |
| Miao.1, Kidney, n = 33 | −0.25 [−1.09; 0.59] | 0.57 |
| Fumet.2, Lung, n = 43 | −0.17 [−0.95; 0.61] | 0.67 |
| Hugo, Melanoma, n = 27 | 0.07 [−1.09; 1.23] | 0.91 |
| Mariathasan, Ureteral, n = 26 | 0.38 [−0.58; 1.34] | 0.44 |
| Braun, Kidney, n = 178 | 0.50 [ 0.09; 0.91] | 0.02 |
| Total | −0.44 [−0.74; −0.13] | |

Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 32.92$ ($P < .001$), $I^2 = 64\%$ [34%; 80%]

Test for overall effect: $z = -2.83$ ($P = .005$)



logHR estimate