Study	logHR [95%CI]	P−value	
Mariathasan, Ureteral, n = 26	−1.06 [−2.73; 0.61]	0.21	
Braun, Kidney, n = 178	−0.57 [−1.31; 0.17]	0.14	
Mariathasan, Kidney, n = 67	0.01 [−1.42; 1.44]	0.99	
Miao.1, Kidney, n = 33	0.25 [−1.18; 1.68]	0.73	
Riaz, Melanoma, n = 51	0.26 [−0.80; 1.32]	0.63	
Nathanson, Melanoma, n = 24	0.50 [−0.52; 1.52]	0.34	
Mariathasan, Bladder, n = 194	0.74 [0.09; 1.39]	0.03	
Liu, Melanoma, n = 121	0.88 [0.14; 1.62]	0.02	
Hugo, Melanoma, n = 27	0.96 [−0.55; 2.47]	0.21	
Snyder, Ureteral, n = 25	1.03 [−1.17; 3.23]	0.36	
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	1.39 [−0.37; 3.15]	0.12	
Van_Allen, Melanoma, n = 42	1.64 [0.66; 2.62]	0.00	
Fumet.2, Lung, n = 43	1.84 [−0.47; 4.15]	0.12	
Total	0.54 [0.10; 0.97]		

Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 21.62$ ($P = .04$), $I^2 = 44\%$ [0%; 71%]

Test for overall effect: $z = 2.42$ ($P = .02$)

logHR estimate