Source	(95% CI)
Primary = Melanoma	
Van_Allen, n = 42	−1.15 [−1.91; −0.39]
Nathanson, n = 24	−0.78 [−1.54; −0.02]
Riaz, n = 51	−0.31 [−0.84; 0.22]
Liu, n = 121	−0.25 [−0.68; 0.18]
Hugo, n = 27	0.30 [−0.78; 1.38]
Total	−0.45 [−0.81; −0.08]

Heterogeneity: $\chi_4^2 = 6.83$ ($P = .15$), $I^2 = 41\%$ [0%; 78%]

Primary = Other	
Snyder, Ureteral, n = 25	−0.42 [−1.32; 0.48]
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	−0.38 [−1.09; 0.33]
Hwang, Lung, n = 21	−0.33 [−1.39; 0.73]
Fumet.2, Lung, n = 43	−0.30 [−0.99; 0.39]
Mariathasan, Bladder, n = 194	−0.25 [−0.54; 0.04]
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.36 [−0.46; 1.18]
Total	−0.24 [−0.46; −0.01]

Heterogeneity: $\chi_5^2 = 2.41$ ($P = .79$), $I^2 = 0\%$ [0%; 75%]

Primary = Kidney	
Mariathasan, n = 67	−0.10 [−0.59; 0.39]
Miao.1, n = 33	0.01 [−0.68; 0.70]
Braun, n = 178	0.09 [−0.24; 0.42]
Total	0.03 [−0.23; 0.28]

Heterogeneity: $\chi_2^2 = 0.4$ ($P = .82$), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]

Total	−0.21 [−0.37; −0.05]

Heterogeneity: $\chi_{13}^2 = 15.13$ ($P = .30$), $I^2 = 14\%$ [0%; 53%]
Test for overall effect: $z = −2.61$ ($P = .009$)
Test for subgroup differences: $\chi_2^2 = 4.83$ ($P = .09$)

−1.5 −0.5 0.5 1 1.5
logHR estimate