Study	logOR [95%CI]	P−value
Miao.1, Kidney, n = 28	−0.06 [−1.39; 1.27]	0.93
Riaz, Melanoma, n = 33	0.29 [−0.94; 1.52]	0.64
Fumet.1, Lung, n = 39	0.42 [−0.78; 1.62]	0.49
Nathanson, Melanoma, n = 24	0.49 [−0.84; 1.82]	0.47
Fumet.2, Lung, n = 41	0.90 [−0.35; 2.15]	0.15
Mariathasan, Bladder, n = 133	1.22 [0.57; 1.87]	0.00
Snyder, Ureteral, n = 22	1.23 [−0.24; 2.70]	0.10
Hugo, Melanoma, n = 27	1.24 [−0.17; 2.65]	0.08
Braun, Kidney, n = 139	1.28 [0.54; 2.02]	0.00
Liu, Melanoma, n = 112	1.59 [0.83; 2.35]	0.00
Van_Allen, Melanoma, n = 39	1.99 [0.28; 3.70]	0.02
Jung, Lung, n = 26	2.11 [0.09; 4.13]	0.04
Mariathasan, Kidney, n = 46	5.59 [1.34; 9.84]	0.01
Total	1.12 [0.82; 1.43]	

Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 14.98$ ($P = .24$), $I^2 = 20\%$ [0%; 58%]

Test for overall effect: $z = 7.18$ ($P < .001$)

Estimated logOR