Study	logOR [95%CI]	P−value
Miao.1, Kidney, n = 28	−2.52 [−5.22; 0.18]	0.07
Fumet.2, Lung, n = 41	−2.22 [−4.57; 0.13]	0.07
Riaz, Melanoma, n = 33	−2.03 [−4.56; 0.50]	0.12
Mariathasan, Kidney, n = 46	−1.45 [−4.39; 1.49]	0.33
Liu, Melanoma, n = 112	−1.26 [−2.73; 0.21]	0.09
Van_Allen, Melanoma, n = 39	−0.83 [−3.61; 1.95]	0.56
Braun, Kidney, n = 139	−0.70 [−1.74; 0.34]	0.19
Jung, Lung, n = 26	−0.68 [−3.76; 2.40]	0.67
Nathanson, Melanoma, n = 24	−0.56 [−2.83; 1.71]	0.63
Fumet.1, Lung, n = 39	−0.19 [−2.99; 2.61]	0.89
Mariathasan, Bladder, n = 133	0.88 [−0.26; 2.02]	0.13
Snyder, Ureteral, n = 22	1.20 [−1.17; 3.57]	0.32
Hugo, Melanoma, n = 27	1.39 [−1.96; 4.74]	0.42
Total	−0.60 [−1.30; 0.10]	

Heterogeneity: χ^2_{12} = 16.15 (P = .18), I^2 = 26% [0%; 61%]

Test for overall effect: z = −1.68 (P = .09)

Estimated logOR