Study	logHR [95%CI]	P−value
Braun, Kidney, n = 178	−0.42 [−0.81; −0.03]	0.04
Mariathasan, Ureteral, n = 26	−0.17 [−1.11; 0.77]	0.73
Mariathasan, Kidney, n = 67	−0.16 [−0.73; 0.41]	0.59
Miao.1, Kidney, n = 33	0.14 [−0.72; 1.00]	0.75
Snyder, Ureteral, n = 25	0.30 [−0.66; 1.26]	0.54
Liu, Melanoma, n = 121	0.32 [−0.19; 0.83]	0.21
Riaz, Melanoma, n = 51	0.32 [−0.35; 0.99]	0.35
Mariathasan, Bladder, n = 194	0.33 [−0.02; 0.68]	0.06
Fumet.2, Lung, n = 43	0.47 [−0.33; 1.27]	0.25
Nathanson, Melanoma, n = 24	0.50 [−0.50; 1.50]	0.33
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	0.78 [−0.18; 1.74]	0.11
Hugo, Melanoma, n = 27	1.00 [−0.23; 2.23]	0.11
Van_Allen, Melanoma, n = 42	1.02 [0.24; 1.80]	0.01
Total	0.25 [0.00; 0.50]	

Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 20.62$ ($P = .06$), $I^2 = 42\%$ [0%; 70%]

Test for overall effect: $z = 1.95$ ($P = .05$)

−0.5 0 0.5 1 1.5

logHR estimate