Source	(95% CI)
Primary = Other	
Snyder, Ureteral, n = 25	−0.89 [−1.77; −0.01]
Van_Allen, Melanoma, n = 42	−0.78 [−1.39; −0.17]
Liu, Melanoma, n = 121	−0.77 [−1.10; −0.44]
Braun, Kidney, n = 178	−0.33 [−0.58; −0.08]
Miao.1, Kidney, n = 33	−0.08 [−1.61; 1.45]
Total	−0.59 [−0.88; −0.30]
Heterogeneity: $\chi^2_4 = 5.98$ ($P = .20$), $I^2 = 33\%$ [0%; 75%]	
Primary = Lung	
Fumet.2, n = 43	−0.80 [−1.39; −0.21]
Jung, n = 26	−0.68 [−1.33; −0.03]
Fumet.1, n = 44	−0.36 [−1.03; 0.31]
Total	−0.63 [−0.99; −0.27]
Heterogeneity: $\chi^2_2 = 0.97$ ($P = .61$), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]	
Total	−0.59 [−0.80; −0.37]
Heterogeneity: $\chi^2_7 = 7.18$ ($P = .41$), $I^2 = 3\%$ [0%; 68%]	
Test for overall effect: $z = -5.37$ ($P < .001$)	
Test for subgroup differences: $\chi^2_1 = 0.03$ ($P = .86$)