Source	(95% CI)	
Primary = Other		
Hwang, Lung, n = 21	−1.70 [−4.21; 0.81]	
Fumet.2, Lung, n = 43	−0.54 [−1.66; 0.58]	
Mariathasan, Bladder, n = 194	−0.47 [−0.88; −0.06]	
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	−0.36 [−1.36; 0.64]	
Snyder, Ureteral, n = 25	−0.03 [−1.38; 1.32]	
Mariathasan, Ureteral, n = 26	1.41 [0.10; 2.72]	
Total	−0.23 [−0.76; 0.30]	
Heterogeneity: $\chi^2_5 = 8.66$ ($P = .12$), $I^2 = 42\%$ [0%; 77%]		
Primary = Melanoma		
Van_Allen, n = 42	−1.08 [−2.12; −0.04]	
Nathanson, n = 24	−1.01 [−2.01; −0.01]	
Riaz, n = 51	−0.90 [−1.66; −0.14]	
Liu, n = 121	−0.73 [−1.38; −0.08]	
Hugo, n = 27	0.69 [−0.84; 2.22]	
Total	−0.77 [−1.17; −0.38]	
Heterogeneity: $\chi^2_4 = 4.19$ ($P = .38$), $I^2 = 5\%$ [0%; 80%]		
Primary = Kidney		
Miao.1, n = 33	−0.23 [−1.45; 0.99]	
Mariathasan, n = 67	0.07 [−0.71; 0.85]	
Braun, n = 178	0.32 [−0.21; 0.85]	
Total	0.19 [−0.23; 0.60]	
Heterogeneity: $\chi^2_2 = 0.78$ ($P = .68$), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]		
Total	−0.32 [−0.65; 0.01]	

Heterogeneity: $\chi^2_{13} = 24.58$ ($P = .03$), $I^2 = 47\%$ [2%; 72%]
Test for overall effect: $z = −1.92$ ($P = .05$)
Test for subgroup differences: $\chi^2_2 = 11.02$ ($P = .004$)

−2 −1 0 1 2
logHR estimate