Source	(95% CI)
Primary = Lung	
Fumet.2, n = 41	−2.15 [−3.78; −0.52]
Jung, n = 26	−1.32 [−2.81; 0.17]
Fumet.1, n = 39	0.25 [−0.93; 1.43]
Total	−0.98 [−2.41; 0.44]
Heterogeneity: $\chi^2_2 = 6.18$ ($P = .05$), $I^2 = 68\%$ [0%; 91%]	
Primary = Melanoma	
Riaz, n = 33	−0.99 [−2.24; 0.26]
Van_Allen, n = 39	−0.64 [−2.03; 0.75]
Liu, n = 112	−0.36 [−1.05; 0.33]
Nathanson, n = 24	−0.32 [−1.67; 1.03]
Hugo, n = 27	−0.24 [−1.57; 1.09]
Total	−0.46 [−0.94; 0.01]
Heterogeneity: $\chi^2_4 = 0.98$ ($P = .91$), $I^2 = 0\%$ [0%; 79%]	
Primary = Other	
Snyder, Ureteral, n = 22	−0.71 [−2.36; 0.94]
Mariathasan, Bladder, n = 133	−0.68 [−1.37; 0.01]
Primary = Kidney	
Miao.1, n = 28	−0.43 [−1.82; 0.96]
Mariathasan, n = 46	−0.40 [−1.77; 0.97]
Braun, n = 139	−0.01 [−0.64; 0.62]
Total	−0.13 [−0.66; 0.40]
Heterogeneity: $\chi^2_2 = 0.47$ ($P = .79$), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]	
Total	−0.39 [−0.71; −0.07]
Heterogeneity: $\chi^2_{10} = 9.61$ ($P = .47$), $I^2 = 0\%$ [0%; 60%]	
Test for overall effect: $z = -2.36$ ($P = .02$)	
Test for subgroup differences: $\chi^2_2 = 1.66$ ($P = .44$)	

−2 −1 0 1 2
Estimated logOR