Source	(95% CI)	
Primary = Other		
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	−1.27 [−2.25; −0.29]	
Hwang, Lung, n = 21	−0.82 [−1.92; 0.28]	
Mariathasan, Bladder, n = 194	−0.36 [−0.71; −0.01]	
Snyder, Ureteral, n = 25	−0.29 [−1.25; 0.67]	
Fumet.2, Lung, n = 43	0.02 [−0.76; 0.80]	
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.13 [−0.81; 1.07]	
Total	−0.37 [−0.64; −0.10]	

Heterogeneity: $\chi^2_5 = 5.95$ ($P = .31$), $I^2 = 16\%$ [0%; 79%]

Primary = Melanoma

Van_Allen, n = 42	−0.97 [−1.73; −0.21]	
Nathanson, n = 24	−0.78 [−1.80; 0.24]	
Riaz, n = 51	−0.55 [−1.24; 0.14]	
Liu, n = 121	−0.37 [−0.88; 0.14]	
Hugo, n = 27	0.19 [−0.97; 1.35]	
Total	−0.52 [−0.84; −0.19]	

Heterogeneity: $\chi^2_4 = 3.37$ ($P = .50$), $I^2 = 0\%$ [0%; 79%]

Primary = Kidney

Mariathasan, n = 67	−0.23 [−0.80; 0.34]	
Miao.1, n = 33	−0.05 [−0.91; 0.81]	
Braun, n = 178	0.24 [−0.15; 0.63]	
Total	0.05 [−0.29; 0.40]	

Heterogeneity: $\chi^2_2 = 1.87$ ($P = .39$), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]

Total	−0.31 [−0.53; −0.08]	

Heterogeneity: $\chi^2_{13} = 18.79$ ($P = .13$), $I^2 = 31\%$ [0%; 63%]
Test for overall effect: $z = −2.66$ ($P = .008$)
Test for subgroup differences: $\chi^2_2 = 5.95$ ($P = .05$)

−1.5 −0.5 0.5 1 1.5
logHR estimate