Source	(95% CI)
Primary = Melanoma	
Liu, n = 121	−0.42 [−0.81; −0.03]
Nathanson, n = 24	−0.38 [−1.24; 0.48]
Riaz, n = 51	−0.36 [−0.91; 0.19]
Van_Allen, n = 42	−0.36 [−0.99; 0.27]
Hugo, n = 27	0.25 [−0.57; 1.07]
Total	−0.33 [−0.58; −0.07]
Heterogeneity: χ^2_4 = 2.14 (P = .71), I^2 = 0% [0%; 79%]	
Primary = Kidney	
Miao.1, n = 33	−0.33 [−1.06; 0.40]
Mariathasan, n = 67	−0.02 [−0.51; 0.47]
Braun, n = 178	0.10 [−0.21; 0.41]
Total	0.02 [−0.23; 0.27]
Heterogeneity: χ^2_2 = 1.17 (P = .56), I^2 = 0% [0%; 90%]	
Primary = Other	
Snyder, Ureteral, n = 25	−0.29 [−1.21; 0.63]
Mariathasan, Bladder, n = 194	0.12 [−0.17; 0.41]
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	0.22 [−0.54; 0.98]
Fumet.2, Lung, n = 43	0.24 [−0.43; 0.91]
Mariathasan, Ureteral, n = 26	1.07 [0.11; 2.03]
Total	0.18 [−0.06; 0.41]
Heterogeneity: χ^2_4 = 4.5 (P = .34), I^2 = 11% [0%; 82%]	
Total	−0.04 [−0.21; 0.13]
Heterogeneity: χ^2_{12} = 16.04 (P = .19), I^2 = 25% [0%; 61%]	
Test for overall effect: z = −0.48 (P = .63)	
Test for subgroup differences: χ^2_2 = 8.23 (P = .02)