Source	(95% CI)
Primary = Melanoma	
Nathanson, n = 24	−1.03 [−3.75; 1.69]
Riaz, n = 33	−0.62 [−2.76; 1.52]
Hugo, n = 27	2.73 [−0.88; 6.34]
Total	−0.08 [−1.79; 1.62]
Heterogeneity: $\chi^2_2 = 3.04$ ($P = .22$), $I^2 = 34\%$ [0%; >78%]	
Primary = Other	
Braun, Kidney, n = 139	−0.33 [−2.31; 1.65]
Snyder, Ureteral, n = 22	0.65 [−2.45; 3.75]
Mariathasan, Bladder, n = 133	0.96 [−0.92; 2.84]
Total	0.40 [−0.85; 1.64]
Heterogeneity: $\chi^2_2 = 0.89$ ($P = .64$), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]	
Total	0.18 [−0.79; 1.14]
Heterogeneity: $\chi^2_5 = 4.22$ ($P = .52$), $I^2 = 0\%$ [0%; 75%]	
Test for overall effect: $z = 0.36$ ($P = .72$)	
Test for subgroup differences: $\chi^2_1 = 0.20$ ($P = .66$)	

−1 0 1 2 3

Estimated logOR