Source	(95% CI)
Primary = Kidney	
Miao.1, n = 28	−2.38 [−4.81; 0.05]
Braun, n = 139	−0.28 [−1.06; 0.50]
Mariathasan, n = 46	0.96 [−0.69; 2.61]
Total	−0.35 [−1.86; 1.17]

Heterogeneity: $\chi^2_2 = 5.03$ ($P = .08$), $I^2 = 60\%$ [0%; >89%]

Primary = Melanoma	
Riaz, n = 33	−0.34 [−2.32; 1.64]
Liu, n = 112	−0.13 [−1.23; 0.97]
Van_Allen, n = 39	0.16 [−1.88; 2.20]
Nathanson, n = 24	0.87 [−1.03; 2.77]
Hugo, n = 27	3.92 [0.45; 7.39]
Total	0.24 [−0.53; 1.01]

Heterogeneity: $\chi^2_4 = 5.52$ ($P = .24$), $I^2 = 27\%$ [0%; 71%]

Primary = Lung	
Fumet.2, n = 41	−0.24 [−1.83; 1.35]
Fumet.1, n = 39	0.16 [−1.53; 1.85]
Jung, n = 26	0.37 [−1.20; 1.94]
Total	0.10 [−0.83; 1.03]

Heterogeneity: $\chi^2_2 = 0.29$ ($P = .86$), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]

Primary = Other	
Mariathasan, Bladder, n = 133	0.24 [−0.43; 0.91]
Snyder, Ureteral, n = 22	0.93 [−0.62; 2.48]
Total	0.00 [−0.44; 0.45]

Heterogeneity: $\chi^2_{10} = 11.72$ ($P = .30$), $I^2 = 15\%$ [0%; 55%]
Test for overall effect: $z = 0.02$ ($P = .99$)
Test for subgroup differences: $\chi^2_2 = 0.47$ ($P = .79$)

−2 0 1 2 3 4
Estimated logOR