
Source
(95% CI)
Primary = Melanoma
Van_Allen, n = 42
−1.12 [−1.85; −0.39]
Nathanson, n = 24
−0.85 [−1.59; −0.11]
Liu, n = 121
−0.60 [−1.03; −0.17]
Riaz, n = 51
−0.51 [−1.04; 0.02]
Hugo, n = 27
0.06 [−0.96; 1.08]
Total
−0.64 [−0.91; −0.36]
Heterogeneity: χ^2_4 = 4.06 (P = .40), I^2 = 2% [0%; 80%]
Primary = Other
Mariathasan, Lymph_node, n = 26
−0.70 [−1.43; 0.03]
Snyder, Ureteral, n = 25
−0.69 [−1.53; 0.15]
Mariathasan, Bladder, n = 194
−0.57 [−0.86; −0.28]
Fumet.2, Lung, n = 43
−0.46 [−1.11; 0.19]
Mariathasan, Ureteral, n = 26
0.50 [−0.26; 1.26]
Total
−0.42 [−0.78; −0.06]
Heterogeneity: χ^2_4 = 7.27 (P = .12), I^2 = 45% [0%; 80%]
Primary = Kidney
Mariathasan, n = 67
−0.36 [−0.83; 0.11]
Miao.1, n = 33
−0.10 [−0.84; 0.64]
Braun, n = 178
0.18 [−0.15; 0.51]
Total
−0.06 [−0.43; 0.32]
Heterogeneity: χ^2_2 = 3.43 (P = .18), I^2 = 42% [0%; 82%]
Total
−0.40 [−0.63; −0.17]
Heterogeneity: χ^2_{12} = 26.90 (P = .008), I^2 = 55% [17%; 76%]
Test for overall effect: z = −3.40 (P < .001)
Test for subgroup differences: χ^2_2 = 5.95 (P = .05)
−1.5 −0.5 0.5 1 1.5
logHR estimate