Source	(95% CI)
Primary = Melanoma	
Hugo, n = 27	−1.14 [−2.67; 0.39]
Van_Allen, n = 42	−0.90 [−1.76; −0.04]
Liu, n = 121	−0.78 [−1.37; −0.19]
Nathanson, n = 24	−0.69 [−1.77; 0.39]
Riaz, n = 51	−0.60 [−1.52; 0.32]
Total	−0.78 [−1.17; −0.40]
Heterogeneity: χ_4^2 = 0.46 (*P* = .98), I^2 = 0% [<0%; <79%]	
Primary = Other	
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	−1.08 [−2.35; 0.19]
Snyder, Ureteral, n = 25	−1.05 [−2.30; 0.20]
Fumet.2, Lung, n = 43	−0.45 [−1.39; 0.49]
Mariathasan, Bladder, n = 194	−0.45 [−0.86; −0.04]
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.47 [−0.61; 1.55]
Total	−0.45 [−0.78; −0.12]
Heterogeneity: χ_4^2 = 4.62 (*P* = .33), I^2 = 13% [0%; 82%]	
Primary = Kidney	
Miao.1, n = 33	0.14 [−1.08; 1.36]
Mariathasan, n = 67	0.32 [−0.33; 0.97]
Braun, n = 178	0.42 [−0.01; 0.85]
Total	0.37 [0.03; 0.71]
Heterogeneity: χ_2^2 = 0.21 (*P* = .90), I^2 = 0% [0%; 90%]	
Total	−0.35 [−0.69; −0.02]
Heterogeneity: χ_{12}^2 = 26.44 (*P* = .009), I^2 = 55% [15%; 76%]	
Test for overall effect: *z* = −2.10 (*P* = .04)	
Test for subgroup differences: χ_2^2 = 21.15 (*P* < .001)	

−1.5 −0.5 0.5 1 1.5

logHR estimate