Source	(95% CI)
Primary = Melanoma	
Nathanson, n = 24	−0.14 [−0.96; 0.68]
Riaz, n = 33	0.27 [−0.53; 1.07]
Hugo, n = 27	0.31 [−0.49; 1.11]
Total	0.15 [−0.32; 0.62]
Heterogeneity: $\chi^2_2 = 0.71$ ($P = .70$), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]	
Primary = Other	
Braun, Kidney, n = 139	−0.11 [−0.48; 0.26]
Fumet.2, Lung, n = 41	0.17 [−0.52; 0.86]
Jung, Lung, n = 26	0.32 [−0.66; 1.30]
Mariathasan, Kidney, n = 46	0.42 [−0.46; 1.30]
Snyder, Ureteral, n = 22	0.72 [−0.59; 2.03]
Mariathasan, Bladder, n = 133	0.80 [0.29; 1.31]
Total	0.32 [−0.06; 0.70]
Heterogeneity: $\chi^2_5 = 8.77$ ($P = .12$), $I^2 = 43\%$ [0%; 77%]	
Total	0.26 [−0.02; 0.55]
Heterogeneity: $\chi^2_8 = 9.60$ ($P = .29$), $I^2 = 17\%$ [0%; 59%]	
Test for overall effect: $z = 1.80$ ($P = .07$)	
Test for subgroup differences: $\chi^2_1 = 0.31$ ($P = .58$)	

−0.5 0 0.5 1

Estimated logOR