Study	logOR [95%CI]	P-value
Gide__Melanoma__PD−(L)1, n = 38	−1.17 [−2.20; −0.14]	0.03
Puch__Melanoma__PD−(L)1, n = 49	−0.80 [−1.54; −0.06]	0.03
Snyder__Ureteral__PD−(L)1, n = 18	−0.75 [−1.80; 0.30]	0.16
Mariathasan__Kidney__PD-(L)1, n = 46	−0.49 [−1.34; 0.36]	0.26
Kim__Gastric__PD−(L)1, n = 31	−0.41 [−1.14; 0.33]	0.28
Mariathasan__Ureteral__PD−(L)1, n = 18	−0.40 [−1.47; 0.67]	0.46
Mariathasan__Bladder__PD−(L)1, n = 133	−0.31 [−0.71; 0.09]	0.12
Liu__Melanoma__PD−(L)1, n = 69	−0.21 [−0.69; 0.27]	0.39
Jung__Lung__PD−(L)1, n = 27	−0.20 [−1.06; 0.67]	0.66
Riaz__Melanoma__PD−(L)1, n = 16	−0.12 [−1.23; 0.99]	0.83
Limagne2__Lung__PD−(L)1, n = 22	−0.06 [−0.99; 0.86]	0.89
Braun__Kidney__PD−(L)1, n = 142	0.01 [−0.37; 0.39]	0.95
Shiuan__Kidney__PD−(L)1, n = 13	0.01 [−1.04; 1.07]	0.98
Hugo__Melanoma__PD−(L)1, n = 27	0.41 [−0.47; 1.28]	0.36
Miao1__Kidney__PD−(L)1, n = 28	0.47 [−0.35; 1.30]	0.26
Total	−0.22 [−0.39; −0.04]	

−1.5 −0.5 0.5 1 1.5
logOR estimate

Heterogeneity: χ^2_{14} = 14.01 (P = .45), I^2 = 0% [0%; 54%]
Test for overall effect: z = −2.41 (P = .02)