MET-348-3 Previsão **Numérica** de Tempo e Clima Docente Responsável: Saulo Freitas

Previsão Numérica de Tempo e Clima

Paulo Yoshio Kubota
DIMNT
CPTEC/INPE

Objetivos

1. Introduzir: técnicas de modelagem numérica, modelos de PNT e Clima

2. Fundamentos: estrutura, dinâmica, física, diagnóstico

3. Experiência prática: em modelagem numérica e análise de dados

4. Disseminação: Compreensão e uso inteligente das saídas dos modelos de PNTC

Tópicos


• Introdução: histórico da PNT, processos e componentes

 Fundamentos básicos dos modelos de PNT: equações, análise de escala e filtragem, coordenadas verticais

• <u>Métodos numéricos</u>: diferenças finitas, Galerkin (espectrais e elementos finitos): espaço e tempo; análise de estabilidade numérica

Processos e componentes

Fluxograma de PNT



Sistema de equações governantes da atmosfera

Equações do Momento:
$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = fv - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \text{termos de atrito}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} = -fu - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \text{termos de atrito}$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \text{termos de atrito}$$

Equação da continuidade:
$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \frac{\partial u}{\partial x} + \rho \frac{\partial v}{\partial y} + \rho \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

Equação da energia termodinâmica: $\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} + w \frac{\partial T}{\partial z} = \text{forçantes diabáticos}$

Equação de estado:

6 equações, 6 incógnitas (u, v, w, p, T, p)

Equações Governantes

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} - \omega \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial p} + f \mathbf{k} \times \mathbf{v} - \nabla \Phi + \mathbf{D}_M$$
 Equações do Momento:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -\mathbf{v} \cdot \nabla T + \omega \left(\frac{\kappa T}{p} - \frac{\partial T}{\partial p} \right) + \frac{\tilde{Q}_{rad}}{c_p} + \frac{\tilde{Q}_{con}}{c_p} + D_H \quad \text{Equação da energia termodinâmica:}$$

$$\frac{\partial q}{\partial t} = -\mathbf{v}\cdot
abla q - \omega \frac{\partial q}{\partial n} + E - C + D_q$$
 Equação da conservação de umidade:

$$\frac{\partial \omega}{\partial n} = -\nabla \cdot \mathbf{v}$$
 Equação da continuidade:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\frac{RT}{p}$$
, Equação de estado:

Métodos numéricos


$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial z} F(u, M_{u,d})$$


$$\frac{u_{j}^{n+1} - u_{j}^{n}}{\Delta t} = -\frac{M}{\rho} \frac{u_{j+1}^{n} - u_{j-1}^{n}}{2\Delta z}$$


$$\Rightarrow \lambda = 1 - \frac{M\Delta t}{\rho \Delta z} \left(\frac{e^{ik\Delta z} - e^{-ik\Delta z}}{2} \right)$$


$$\Rightarrow |\lambda| = \sqrt{1 + \left(\frac{M\Delta t}{\rho \Delta z}\right)^2 \sin^2(k\Delta z)} \qquad |\lambda| > 1$$


Os tipo de Grades












Escalas: temporais e espaciais



As maiores fontes de Energia e Momentum

Escalas: temporais e espaciais







Figura 8: A Grande Onda de Kanagawa (Kanagawa oki nami



Qual a importância da escalas?





Figura 12: Espectro de energia, em escala dilog (unidades arbitrárias de energia E(k) e número de onda k) obtido a partir de séries temporais (disponíveis na base de dados em turbulência da Universidade Johns Hopkins [129]) para um escoamento em túnel de vento com número de Revnolds Re = 3×10^4 .

Moriconi, L. e Pereira, R.M.. A física estatística da turbulência. Revista Brasileira de Ensino de Física [online]. 2021, v. 43, n. Suppl 1 [Acessado 1 Julho 2023], e20200450. Disponível https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2020-0450. **Epub** 05 Mar 2021. ISSN 1806-9126. https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2020-0450.

Quais os impactos das Escalas



Utilidade da PNT

Algarve, 2007




Utilidade da PNT

Algarve, 2007



Utilidade da PNT

Algarve, 2007



Principal Ferramenta par a PNTC

• Modelos: Tipos de modelos, resolução e condições de fronteira

• Física e parametrizações dos modelos: camada limite, fluxos de superfície (interface), física úmida (convecção, microfísica), radiação

• Modelos global e regional do CPTEC: atmosféricos/acoplados

Componentes do Modelo

• parametrização física: "procedimento matemático que descreve os efeitos estatísticos de processos de sub-grade sobre o fluxo médio em função de parâmetros de grande escala",

• dinâmica: calculo dos outros termos das equações de Navier-Stokes

Métodos de Avaliação do Modelos

Geral:


- RMSE
- BIAS (VIES)
- Variância

Precipitação

- Hit hate,
- Threat score,
- FAR,
- · POD,
- · BIAS,
- · IS,
- · IR


Diagnósticos

Anl: 00Z 18 Oct 2014, Girua (RS)




Series Temporais por localidade


WRF vs OBS




Avaliação





Avaliação






Figueroa et al. 2016 (BAM)









Fernandez et al. 2015

Fig. 1: Previsões de precipitação (mm/dia) medias mensais do WRF-CPT 9km.

América do Sul – 9 km Ciclones extra-tropicais




Eventos extremos Parana Julho 2015



Prec 24hr [mm]

Fernandez et al. 2015

WRF-CPT 03km



$$X^{a}_{i} = X^{b}_{i} + K [y - H X^{b}_{i}]$$

- Fontes e controle de qualidade, esquemas de analise objetiva.
- Introdução a métodos avançados de assimilação.
- Inicialização dinâmica e física




Figura 1 Total de observações utilizadas por ciclo de assimilação durante janeiro de 2003 (linha preta) e 2004 (linha amarela) para a região sul-americana (área compreendida entre 100W e 10W e 60S e 20N). Frequência temporal de 6 horas.

Vertical Grid

Horizontal grid




Figura 2 Disposição das variáveis no modelo ETA: a) vertical (Black, 1994) e b) horizontal (por exemplo, sobre o Sudeste do Brasil).

Data Interpolation





Figura 11 Inflação adaptativa para o período de janeiro de 2003: a) horizontal e b) vertical. c) serie temporal do RMS da pressão a superfície para o mês de janeiro de 2003: Inflação fixa (linha azul) e adaptativa (linha continua).

Tipo de Software de Assimilação de dados






Figura 14: Series temporais de precipitação acumulada diária para janeiro de a) 2003 e b) 2004 Linhas preta (obs), vermelha (RPSAS) e azul (RLETKF).

Comportamento Caótico da Atmosfera

- Conceitos fundamentais de sistemas caóticos e previsibilidade atmosférica
- Previsão por conjuntos operacional e de pesquisa
- Previsão sazonal (climática)
- Projeções do clima futuro

Ensemble

