
フレイル判定別人数




フレイル判定別人数(人)

可能性は低い	
プレフレイル	
フレイル	



202	
5	
119	
326	


男女別 フレイル判定人数



フレイル判定別人数(人)

	判定別合計	男	女
可能性は低い	202	50	152
プレフレイル	5	4	1
フレイル	119	18	101
合計	326	72	254


フレイル判定別 フレイル区分人数



フレイル判定別 フレイル区分人数(人)

フレイル区分	可能性は低い	プレフレイル	フレイル	合計			
生活機能全般	50	0	10	60			
運動機能低下	0	0	10	10			
低栄養	0	0	10	10			
口腔機能低下	0	0	18	18			
閉じこもり	52	5	18	75			
物忘れ	52	5	18	75			
うつ傾向	150	1	119	270			


男女別 フレイル判定別 フレイバ




フレイル判定別 フレイル区分人数(人)

- L / II F /	可能性は低い			プレフレイル			フレイル			合計
フレイル区分	区分別合計	男	女	区分別合計	男	女	区分別合計	男	女	
生活機能全般	50	0	50	0	0	0	10	10	0	60
運動機能低下	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10
低栄養	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10
口腔機能低下	0	0	0	0	0	0	18	18	0	18
閉じこもり	52	50	2	5	4	1	18	18	0	75
物忘れ	52	50	2	5	4	1	18	18	0	75
うつ傾向	150	0	150	1	0	1	119	18	101	270

フレイル区分別人数






フレイル区分別人数(人)

生活機能全般	
運動機能低下	
低栄養	
口腔機能低下	
閉じこもり	
物忘れ	
うつ傾向	
合計	

60
10
10
18
75
75
320
568


男女別 フレイル判定人数



フレイル区分別人数(人)

	区分別合計	男	女
生活機能全般	60	10	50
運動機能低下	10	10	0
低栄養	10	10	0
口腔機能低下	18	18	0
閉じこもり	75	72	3
物忘れ	75	72	3
うつ傾向	320	18	302
合計	568	210	358


年齢別 フレイル判定人数



年齢別 フレイル判定人数(人)

	フレイルの疑いなし	プレフレイル	フレイル
64~69歳	0	0	0
70~74歳	0	0	1
75~79歳	52	4	17
80歳以上	113	1	76
合計	165	5	94


男女別 年齢別 フレイル判定人数




フレイル判定別 フレイル区分人数(人)

	可能性は低い			プレフレイル			フレイル		
	年代別合計	男	女	年代別合計	男	女	年代別合計	男	女
64~69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70~74歳	0	0	0	0	0	0	1	1	0
75~79歳	52	50	2	4	4	0	17	17	0
80歳以上	113	0	113	1	0	1	76	0	76
合計	165	50	115	5	4	1	94	18	76

フレイル判定受検者人数






フレイル判定受検者人数(人)

受検者数	未実施者数	合計
376	758	1,134


年齢別 フレイル判定受検者人数



年齢別 フレイル判定受検者人数(人)

	64~69歳	70~74歳	75~79歳	80歳以上	合計
受検者数	0	1	73	227	301
未実施者数	0	0	3	567	570

男女別 フレイル判定受検者人数



男女別 フレイル判定受検者人数(人)

	男	女	合計
受検者数	72	304	376
未実施者数	508	250	758