

.....Риск за репродуктивното състояние на стадото

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?


- Ку-треската е втората причина за повтарящи се аборти при кравите
- При серопозитивните към Ку-треска крави има 2,5 пъти по-голям риск за абортване и 1,5 пъти за задържане на плацентата
- Стада с позитивни проби за мляко (от сборно мляко) имат 2,5 пъти по-голям риск за поява на метрит и клиничен ендометрит

РАЗПОЗНАВАТЕ ЛИ ТЕЗИ ПРИЗНАЦИ?

Слаби новородени
Мъртво родени
Преждевременно отелване

Аборти
Безплодие
Задържана плацентата
Метрити

Всяко намаляване на репродуктивните показатели силно повлиява доходността на фермата



цена за всеки отворен ден



цена за аборт

..... Ку-треската може да засегне и Вас

Ку-треската е зооноза, така че Вие като професионалист, ако сте в контакт със заразени ферми, също сте в риск.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ ПРИ ХОРАТА?



Групопнеумонии




Аборти



Хенатум и ендокардит




Не поемайте ненужен риск, ваксинирайте!



P.V.1 първоначална ваксинация
P.V.2 второ инжектиране

Ваксинална доза

4 мл за крави
2 мл за кози



COXEVAC инжекционна суспензия за говеда и кози

Всеки ml съдържа: Инактивирана *Coxiella burnetii*, щам Nine Mile ≥ 72 QF Units*

*QF (Q-fever) Unit: относителна потенция на фаза I антиген, измерена чрез ELISA в

сравнение с референтна точка. Експципенти: Thiomersal 120 ug. Бяла опалесцентна

хомогенна суспензия. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Говеда: За активна имунизация на говеда за

намаляване риска за неинфектираните животни, ваксинирани когато не са бременни, да станат разпространители (5 пъти по-ниска вероятност в сравнение с животни, получаващи плацебо) и за намаляване на излъчването на *Coxiella burnetii* при тези животни чрез млякото и вагиналната слуз. Продължителност на имунитета: 280 дни след приключване на курса на първичната ваксинация. **Кози:** За активна имунизация на кози за намаляване на абортите, причинени от *Coxiella burnetii* и намаляване на излъчването на *Coxiella burnetii* чрез млякото, вагиналната слуз, фекалиите и плацентата. Продължителност на имунитета: една година след завършването на курса за първична ваксинация. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** Няма. **НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ Говеда:** Много често при лабораторни проучвания е била наблюдавана палпация се кожна реакция с максимален диаметър от 9 до 10 cm на мястото на инжектиране, която може да трае 17 дни. Реакцията постепенно намалява и изчезва без третиране. **Кози:** Много често при лабораторни проучвания е била наблюдавана палпация се кожна реакция с максимален диаметър от 3 до 4 cm на мястото на инжектиране, която може да трае 6 дни. Реакцията постепенно намалява и изчезва без третиране. Много често при лабораторни проучвания е било наблюдавано леко покачване на ректалната температура за 4 дни след ваксинацията. След лицензирането за употреба на продукта във връзка с проследяване на лекарствената безопасност са наблюдавани: не често системни признаци, като летаргия, неразположение и/или анорексия; рядко диария. **ДОЗИРОВКА, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:** Подкожно инжектиране. **Говеда:** 4 ml в областта на врата. **Кози:** 2 ml в областта на врата. **Говеда от 3-месечна възраст:** Първична ваксинация: Две дози трябва да бъдат приложени подкожно през интервал от 3 седмици. При нормални условия времето за ваксинация трябва да бъде планирано така, че курсът на първичната ваксинация да бъде завършен до 3 седмици преди изкуственото осеменяване или чифтосването. **Реваксинация:** На всеки 9 месеца, както е описано за първичната ваксинация, основано на продължителността на имунитета от 280 дни. **Кози от 3-месечна възраст:** Първична ваксинация: Две дози трябва да бъдат приложени подкожно през интервал от 3 седмици. При нормални условия времето за ваксинация трябва да бъде планирано така, че курсът на първичната ваксинация да бъде завършен до 3 седмици преди изкуственото осеменяване или чифтосването.

Реваксинация: с една доза годишно. Разклатете добре преди употреба. Спазвайте обичайните правила за асептика при прилагането. **КАРЕНТЕН СРОК:** Месо, вътрешни органи и мляко: нула дни. Ваксината може да бъде използвана по време на лактация. **Опаковка:** пластмасови флакони по 40 ml и 100 ml. Лиценз за употреба

Не губете фермата си заради Ку-треска!



Една от всеки две ферми е в риск от Ку-треска

Ку-треската е заплаха за вас и за фермата. Защитете животните, печалбата и здравето си.

COXEVAC® Ваксинирайте сега




Ку-треска

Реална заплаха за фермата



Фермерите не трябва да подценяват това заболяване, защото всяка втора ферма, тествана за Ку-треска, дава положителен резултат



Стойностите по страни показват процента на стада, дали положителен резултат за Ку-треска. Определено с ELISA или PCR в сборно мляко.



Роден за да създава проблеми


Говедата се заразяват главно при вдишване на частици, замърсени с бактерията.

Заразените крави, дори и без симптоми отделят причинителя главно чрез изтечения при раждане или аборт, млякото и фекалиите




ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

C. burnetii може да пропътува до 18 km, носена от вятъра и да зарази други стада



Диагностичен подход




- Вземането на пробите трябва да стане до 8 дни след аборта. Те трябва да се съхраняват охладени и да се изпратят към ветеринарен диагностичен център възможно най-скоро.
- Правилният подбор на кравите е критично важен за серологията. Вземете проби от минимум 6 крави, които са абортирали наскоро (с давност между 15 дни и 3 месеца) или имат смущения в репродукцията (безплодие, метрити, задържана плацента)

COXEVAC®


Единствената ваксина за справяне с репродуктивните проблеми, причинени от Ку-треска

30% По-малък риск от абортиране


40% Увеличаване на % бременност при 1-то изкуствено осеменяване (ИО)



2 седмици по-малко до начало на бременността




Ваксинацията ще позволи получаване на до 140 лв от крава за една лактация само чрез намаляване на отворените дни



Ефективно намаляване на C. burnetii в организма на животните

5 пъти по-малко разпространяване на заболяването



ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

Coxevac е единствената ултра пречистена ваксина, съдържаща C. burnetii, осигуряваща оптимален клетъчен и хуморален имунен отговор