

..... Un risque pour la fertilité dans votre élevage

LE SAVIEZ-VOUS?


- La fièvre Q est la 2ème cause des avortements répétitifs chez les bovins en France.⁷
- Une vache qui est positif en anticorps, a 2,5x plus de risque d'un avortement et 1,5x plus de risque d'une rétention placentaire.⁵
- Des élevages avec un tank de lait positif ont 2,5x plus de risque d'une prévalence élevée de métrites et endométrites cliniques.⁸

VOUS RECONNAISSEZ CES SYMPTÔMES?

veaux faibles
avortement
infertilité
métrite
mortinaissance
rétention placentaire
vêlage précoce

..... Une menace pour la rentabilité de l'élevage...

Chaque diminution de la fertilité a un grand impact sur la rentabilité d'un élevage.



..... La fièvre Q peut infecter vous-même!

La fièvre Q est une zoonose; donc si en contact avec des élevages infectés, aussi un risque pour vous!

QUELS SONT LES SYMPTÔMES CHEZ L'HOMME?



Grippe




Avortement



Hépatite et endocardite



Prenez pas de risques, vaccinez!




P.V.1 1^{ère} primo vaccination
P.V.2 2^{ème} primo vaccination

Dosage

4 ml pour bovins
2 ml pour caprins

Selon une étude de Courcoul réalisée en 2011, un programme de vaccination d'une durée de 5 ans est nécessaire pour que le troupeau se libère des excréteurs.¹¹




References

1. Barberio, A., Ceglie, L., Lucchese, L., Zuliani, F., Marangon, S., Natale, A., 2017. Epidemiology of Q fever in cattle, in: The Principles and Practice of Q Fever: The One Health Paradigm. Nova Science Publishers, New York, pp. 189–212. 2. Guatteo, R., Beaudreau, F., Berri, M., Rodolakis, A., Joly, A., Seegers, H., 2006. Shedding routes of Coxiella burnetii in dairy cows: implications for detection and control. Vet. Res. 37, 827–833. 3. Hawker JI, Ayres JG, Blair I, Evans MR, Smith DL, Smith EG, et al. A large outbreak of Q fever in the West Midlands: windborne spread into a metropolitan area? Commun Dis Public Health. 1998; 1:180–74. 4. Ordroneau, S., 2012. Impact de la vaccination et de l'antibiothérapie sur l'incidence des troubles de la reproduction et sur la fertilité dans des troupeaux bovins laitiers infectés par Coxiella burnetii. INRA - ONIRIS, 1300 BioEPAR Biologie, Épidémiologie et Analyse du Risque. Centre de Recherche Angers-Nantes, Nantes, France. 5. Lopez Helguera, I., Tutusaus, J., Souza, A., Jimenez, A., Munoz-Bielsa, J., Garcia Ispuerto, I., 2014. Vaccinating against Q-fever with an inactivated phase-I vaccine (COXEVAC®) improves reproductive performance in Coxiella burnetii-infected dairy herds. Presented at the XXVIII World Buiatrics Congress, Cairns, Australia 2014, pp. 274–275. 6. Guatteo R., Seegers H., Joly A., Beaudreau F., 2008. Prevention of Coxiella burnetii shedding in infected dairy herds using a phase I C. burnetii inactivated vaccine. Vaccine. 26(34):4320–4328 7. Gache, K. 2018. Observatoire et suivi des causes d'avortements chez les ruminants Bilan 2017. OSCAR. Plateforme ESA. https://www.plateforme.esa.fr/sites/default/files/R%C3%A9sultats%20OSCAR%202017_VF.pdf. 8. Valla, G., 2014. Prevalenza di Coxiella burnetii nel latte di massa in allevamenti di bovine da latte italiani e possibile correlazione con problemi riproduttivi. Large Animal Review 51–56. 9. Cabrera, V.E., 2014. Economics of fertility in high-yielding dairy cows on confined TMR systems. Animal 8 Suppl 1, 211–221. 10. de Vries, A. 2006. Economic Value of Pregnancy in Dairy Cattle. Journal of Dairy Science. Volume 89, Issue 10, Pages 3876–3885. 11. Courcoul, A., Hogerwerf, L., Klinkenberg, D., Nielsen, M., Vergu, E., & Beaudreau, F. (2011). Modelling effectiveness of herd level vaccination against Q fever in dairy cattle. Veterinary research, 42(1), 68. doi:10.1186/1297-9716-42-68

COXEVAC suspension injectable pour bovins et caprins. COMPOSITION: chaque ml: Coxiella burnetii inactivé, souche Nine Mile ≥ 72 unités FQ. **INDICATIONS:** Bovins: Immunisation active des bovins afin de réduire le risque chez les animaux vaccinés non-infectés et non-gestants de devenir excréteurs et afin de réduire l'excrétion de Coxiella burnetii chez ces animaux par le lait et le mucus vaginal. Caprins: Immunisation active des caprins afin de réduire les avortements causés par Coxiella burnetii et réduire son excrétion de l'organisme par le lait, le mucus vaginal, les fèces et le placenta. **CONTRE-INDICATIONS:** Aucune. **EFFETS INDÉSIRABLES:** Bovins: Une réaction palpable d'un diamètre de 9 à 10 cm au point d'injection pouvant durer jusqu'à 17 jours a été très fréquemment observée. Cette réaction régresse progressivement et disparaît sans traitement. Caprins: Une réaction palpable d'un diamètre de 3 à 4 cm au point d'injection pouvant durer jusqu'à 6 jours a été très fréquemment observée. Cette réaction régresse et disparaît sans traitement. Une légère augmentation de la température rectale (pendant 4 jours après la vaccination) a été très fréquemment observée. Des signes systémiques tels que léthargie, malaise et/ou anorexie ont été peu fréquemment observés. Dans les conditions du terrain, la vaccination avec COXEVAC a fréquemment été suivie d'une diminution de la production de lait chez les chèvres. Des précautions doivent être prises pour réduire le stress autant que possible lors de l'administration du produit puisqu'il contribue à cette réaction indésirable. **POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION:** Voie sous-cutanée. Bien agiter avant emploi. Posologie : Bovins: 4 ml à partir de 3 mois d'âge. Caprins : 2 ml à partir de 3 mois d'âge. Bovins: Primo-vaccination: 2 injections doivent être administrées par voie sous-cutanée à 3 semaines d'intervalle. Rappel: Tous les 9 mois. Caprins: Primo-vaccination: 2 injections doivent être administrées par voie sous-cutanée à 3 semaines d'intervalle. Rappel: une injection une fois par an. **TEMPS D'ATTENTE:** 0 jours. **PRÉSENTATION:** Boîte de 1 flacon plastique densité de 40 ml. **TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ:** Ceva Santé Animale SA, Avenue de la métrologie 6, 1130 Bruxelles - Belgique. **NUMÉRO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ:** EU/2/10/110/001-002. **DÉLIVRANCE:** A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.




2019/RU-018



Un élevage sur deux est à risque pour la fièvre Q.

La fièvre Q est un risque pour vous et vos élevages. Protéger vos animaux, votre profit et votre santé.

COXEVAC® Vaccinez maintenant




La fièvre Q

Une menace pour votre élevage



Avec plus que 50% des élevages positifs pour la fièvre Q, on ne peut pas sous-estimer la maladie.¹

Le pourcentage par pays montre le nombre des élevages positifs. La prévalence était diagnostiquée par ELISA ou PCR sur le tank de lait.




Une bactérie dangereuse


Les bovins s'infectent souvent par l'inhalation de poussière, contaminée avec la bactérie.

Des bovins infectés, même asymptomatique, peuvent excréter *C. burnetii* au moment du vêlage ou de l'avortement, mais aussi par les sécrétions vaginales, le lait ou la matière fécale.²

Par inhalation




C. burnetii est très résistant dans l'environnement.




LE SAVIEZ-VOUS?

C. burnetii peut se propager jusqu'à 18 km de distance par le vent et infecter d'autres animaux.³



Diagnostic



Dans certains cas, des analyses supplémentaires peuvent être utiles. Pour plus d'information, contactez votre délégué Ceva.

¹ Prélèvements dans les 8 jours après l'avortement. Conservez les échantillons au frais et envoyez-les au plus vite possible au labo.
² C'est important de bien sélectionner les animaux pour la sérologie. Prélevez au moins 6 animaux qui ont avorté récemment (Plus que 15j passés et 3 mois au maximum) ou des animaux avec des problèmes de reproduction (infertilité / métrite / rétention placentaire).



COXEVAC®

Un vaccin unique qui attaque l'impact de la fièvre Q

30% moins de risque d'un avortement⁴

40% plus de réussite au 1^{er} IA⁵

2 semaines plus vite gestante⁵



La vaccination vous fait bénéficier 70€ / vache / lactation, ne tenant compte que sur le nombre de jours ouverts.




5€
FRAIS PAR JOUR⁹



Réduit efficacement la pression d'infection

5 fois moins de risque de devenir excréteur.⁶



LE SAVIEZ-VOUS?

Coxevac est le seul vaccin phase I *C. burnetii* qui génère une bonne réponse immunitaire cellulaire et humorale.