

## Een risico voor de vruchtbaarheidsresultaten op uw bedrijf

### WIST JE DAT?

- Q-koorts is de 2de oorzaak van herhaalde abortussen bij rundvee in Frankrijk.<sup>7</sup>
- Een koe die As positief is, heeft 2.5 keer meer kans op abortus en 1.5 keer meer kans op problemen met de nageboorte.<sup>5</sup>
- Bedrijven met een positieve tankmelk hebben 2.5x meer kans op verhoogde incidentie van metritis en klinische endometritis.<sup>8</sup>

HERKEN  
JE DEZE  
SYMPTOMEN?

Zwakke  
kalveren

Abortus

Onvruchtbaarheid

Doodgeboorte

Ophouden nageboorte

Vroegtijdig  
afkalven

Metritis

## Een bedreiging voor de rendabiliteit van het bedrijf

Elke daling van de vruchtbaarheid zorgt voor een sterke impact op de winstgevendheid van een bedrijf



kost van een  
extra open dag<sup>9</sup>



kost van een  
abortus<sup>10</sup>

## Q-koorts kan ook u besmetten

Q-koorts is een zoönose, dus indien u in contact komt met besmette bedrijven, kan het ook voor u een risico vormen.

WAT ZIJN DE  
SYMPTOMEN  
BIJ DE MENS?



Griep




Abortus



Hepatitis en  
endocarditis



## Neem geen onnodige risico's, vaccineer!




P.V.1 1<sup>ste</sup> primo vaccinatie  
P.V.2 2<sup>de</sup> primo vaccinatie

Vaccin dosis

4 ml voor runderen  
2 ml voor geiten

Volgens een studie van Courcoul in 2011 is een vaccinatieprogramma van 5 jaar nodig om de kudde volledig vrij te krijgen.



### Referenties

1. Barberio, A., Ceglie, L., Lucchese, L., Zuliani, F., Marangon, S., Natale, A., 2017. Epidemiology of Q fever in cattle, in: The Principles and Practice of Q Fever: The One Health Paradigm. Nova Science Publishers, New York, pp. 189–212. 2. Guatteo, R., Beaudreau, F., Berri, M., Rodolakis, A., Joly, A., Seegers, H., 2006. Shedding routes of Coxiella burnetii in dairy cows: implications for detection and control. Vet. Res. 37, 827–833. 3. Hawker JI, Ayres JG, Blair I, Evans MR, Smith DL, Smith EG, et al. A large outbreak of Q fever in the West Midlands: windborne spread into a metropolitan area? Commun Dis Public Health. 1998; 1:180–74. 4. Ordroneau, S., 2012. Impact de la vaccination et de l'antibiothérapie sur l'incidence des troubles de la reproduction et sur la fertilité dans des troupeaux bovins laitiers infectés par Coxiella burnetii. INRA - ONIRIS, 1300 BioEpAR Biologie, Épidémiologie et Analyse du Risque. Centre de Recherche Angers-Nantes, Nantes, France. 5. Lopez Helguera, I., Tutusaus, J., Souza, A., Jimenez, A., Munoz-Bielsa, J., Garcia Isperto, I., 2014. Vaccinating against Q-fever with an inactivated phase-I vaccine (COXEVAC®) improves reproductive performance in Coxiella burnetii-infected dairy herds. Presented at the XXVIII World Buiatrics Congress, Cairns, Australia 2014, pp. 274–275. 6. Guatteo R, Seegers H, Joly A, Beaudreau F., 2008. Prevention of Coxiella burnetii shedding in infected dairy herds using a phase I C. burnetii inactivated vaccine. Vaccine. 26(34):4320–4328. 7. Gache, K. 2018. Observatoire et suivi des causes d'avortements chez les ruminants Bilan 2017. OSCAR. Plateforme ESA. [https://www.pplateforme.esa.fr/sites/default/files/R%C3%A9sultats%20OSCAR%202017\\_VF.pdf](https://www.pplateforme.esa.fr/sites/default/files/R%C3%A9sultats%20OSCAR%202017_VF.pdf). 8. Valla, G., 2014. Prevalenza di Coxiella burnetii nel latte di massa in allevamenti di bovina da latte italiani e possibile correlazione con problemi riproduttivi. Large Animal Review 51–56. 9. Cabrera, V.E., 2014. Economics of fertility in high-yielding dairy cows on confined TMR systems. Animal 8 Suppl 1, 211–221. 10. de Vries, A. 2006. Economic Value of Pregnancy in Dairy Cattle. Journal of Dairy Science. Volume 89, Issue 10, Pages 3876–3885. 11. Courcoul, A., Hogerwerf, L., Klittenberg, D., Nielsen, M., Vergu, E., & Beaudreau, F. (2011). Modelling

**COXEVAC suspensie voor injectie bij runderen en geiten. SAMENSTELLING:** per ml: geïnactiveerde Coxiella burnetii nine mile stam > 72 QFU. **INDICATIES:** Runderen: voor de actieve immunisatie van runderen om het risico te verlagen dat niet-geïnficeerde dieren, welke niet-drachtig gevaccineerd werden, uitscheider worden en verminderen van de uitscheiding van Coxiella burnetii via melk en vaginale uitscheiding. Geiten: voor de actieve immunisatie van geiten om abortus veroorzaakt door Coxiella burnetii te verminderen, en de uitscheiding van het organisme via melk, vaginale uitscheiding, feces en placenta te verminderen. **CONTRA-INDICATIES:** Geen. **BIJWERKINGEN:** Runderen: zeer vaak wordt een palpeerbare reactie met een maximale diameter van 9 tot 10 cm op de injectieplaats gezien, welke 17 dagen kan duren. Deze reactie neemt geleidelijk af en verdwijnt zonder dat behandeling noodzakelijk is. Geiten: zeer vaak wordt een palpeerbare reactie met een diameter van 3 tot 4 cm op de injectieplaats gezien, welke 6 dagen kan duren. Deze reactie neemt geleidelijk af en verdwijnt zonder dat behandeling noodzakelijk is. Zeer vaak wordt gedurende 4 dagen na injectie een lichte verhoging van de rectale temperatuur waargenomen. Systemische symptomen zoals lusteloosheid, malaise en/of anorexia werden soms waargenomen. Onder veldomstandigheden wordt vaccinatie met dit diergeneesmiddel bij geiten nog al eens gevolgd door een daling in de melkproductie. Aangezien stress kan bijdragen aan deze bijwerking, moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen om stress tijdens de toediening van het diergeneesmiddel zo veel mogelijk te voorkomen. **DOSERING EN TOEDIENINGSWEG:** Voor subcutaan gebruik. Goed schudden voor gebruik. Dosering: runderen 4 ml vanaf een leeftijd van 3 maanden; geiten 2 ml vanaf een leeftijd van 3 maanden. Runderen: primaire vaccinatie: 2 doseringen met een interval van 3 weken. Hervaccinatie: elke 9 maanden. Geiten: primaire vaccinatie: 2 doseringen met een interval van 3 weken. Hervaccinatie: 1 dosis moet jaarlijks worden gegeven. **WACHTTIJD:** 0 dagen. **PRESENTATIE:** een plastic flacon met 40 ml suspensie. **VERGUNNINGHOUDER:** Ceva Santé Animale NV, Metrologielaan 6, 1130 Brussel - België. **REGISTRATIENUMMER:** EU/2/10/110/001-002. **AFLEVERINGSWIJZE:** enkel op diergeneeskundig voorschrift.



## 1 op 2 bedrijven loopt een risico op Q-koorts

Q-koorts is een risico voor u en uw bedrijf. Bescherm uw dieren, uw rendement en uw gezondheid.

COXEVAC® Vaccineer nu






# Q-koorts

## Een bedreiging voor uw bedrijf



Met meer dan 1 op 2 bedrijven positief voor Q-koorts, valt het belang van deze aandoening niet te onderschatten.<sup>1</sup>



Het percentage per land geeft het aantal positieve bedrijven weer. De bedrijfsprevalentie werd bepaald aan de hand van ELISA of PCR op de tankmelk.



## Een gevaarlijke bacterie

Runderen worden vooral besmet door het inhaleren van stofdeeltjes die besmet zijn met de bacterie.


Besmette dieren, zelfs asymptomatisch, scheiden *C. burnetii* vooral uit bij de kalving of abortus, maar ook via vaginale secreties, mest en melk.<sup>2</sup>



### WIST JE DAT?

*C. burnetii* kan tot 18 kilometer ver worden verspreid door de wind en andere dieren infecteren.<sup>3</sup>

## Diagnostiek



In sommige gevallen kan bijkomend onderzoek zinvol zijn. Neem voor meer info contact op met uw vertrouwde Ceva contactpersoon.

<sup>1</sup> Staalname moet gebeuren binnen de 8 dagen na de abortus. De stalen worden best gekoeld bewaard en zo snel mogelijk naar het labo verstuurd.  
<sup>2</sup> Het is belangrijk om de dieren voor serologie goed te selecteren. Bemonster minimum 6 dieren die recent aborteerden (meer dan 15d geleden en maximum 3 maand) of dieren met vruchtbaarheidsstoornissen (onvruchtbaarheid, metritis en/of ophouden van de nageboorte)


# COXEVAC®

## Een uniek vaccin dat de impact van Q-koorts aanpakt


**30%** minder risico op abortus<sup>4</sup>



**40%** hogere CR bij 1ste KI<sup>5</sup>



**2 weken sneller** drachtig<sup>5</sup>



Vaccinatie geeft een winst van 70€ / koe / lactatie, enkel rekening gehouden met verminderd aantal open dagen.




KOST OPEN DAG<sup>9</sup>



## Verlaagt effectief de infectiedruk!

**5 keer minder** kans op chronisch uitscheiden<sup>6</sup>



### WIST JE DAT?

Coxevac is het enige fase I *C. burnetii* vaccin dat een optimale cellulaire en humorale immuunrespons opwekt.