



COXEVAC

Nu lăsa FEBRA Q să îți afecteze ferma

Una din 2 ferme este expusă riscului de infecție cu *Coxiella Burnetii*

FEBRA Q | Vaccinați acum!

Febra Q este o zoonoză, care te poate afecta atât pe tine, cât și animalele din fermă.

PROTEJEAZĂ-ȚI ANIMALELE, PROFITUL ȘI SĂNĂTATEA!

**Un pericol pentru performanțele
reproductive în fermă!**

**Ați întâlnit
următoarele
semne?**

Fătări premature
Retenții Placentare
Mortalități la fătare

Avorturi

Infertilitate

Metrite

Știați că: Un animal pozitiv la Febra Q are șanse de 2.5 ori mai mari să avorteze și de 15 ori mai multe șanse de a avea retenție placentară?

În fermele depistate pozitiv la infecția cu Febra Q crește incidența metritelor și endometritelor cu până la 2.5 ori?



INFORMAȚII DESPRE PRODUS:

COXEVAC, suspensie injectabilă pentru bovine și caprine.

SUBSTANȚE ACTIVE

Substanțe active:

Coxiella burnetii inactivată, tulpina "Nine mile" ≥ 72 unități QF*

*Unitate QF (febra Q): potența relativă a antigenului faza I măsurat prin ELISA comparativ cu un număr de referință

Excipient

Tiomersal $\leq 120 \mu\text{g}$

Precauții speciale pentru utilizare

Se recomandă să vaccinați toate animalele din efectiv în același timp.

În condiții de teren, la capre, vaccinarea cu COXEVAC a fost de obicei urmată de o scădere a producției de lapte. Deoarece stresul ar putea contribui la această reacție adversă, trebuie luate măsuri adecvate de precauție pentru a reduce stresul cât mai mult posibil în timpul administrării produsului.

REAȚII ADVERSE

Bovine

A fost foarte frecventă, în studiile de laborator, observarea unei reacții palpabile cu un diametru maxim de 9-10 cm la locul de injecție, care poate dura până la 17 zile. Această reacție scade gradual și dispare fără a fi necesar vreun tratament.

Caprine

A fost foarte frecventă, în studiile de laborator, observarea unei reacții palpabile cu un diametru maxim de 3-4 cm la locul de injecție, care poate dura până la 6 zile. Această reacție scade gradual și dispare fără a fi necesar vreun tratament.

A fost foarte frecventă, în studiile de laborator, observarea unei ușoare creșteri a temperaturii rectale timp de 4 zile post-vaccinal.

Mai puțin frecvente au fost observate din experiența înregistrată după punerea pe piață a produsului, semne sistemice ca letargia, indispoziția și/sau anorexia.

Din experiența înregistrată după punerea pe piață a produsului, au fost rare cazurile de diaree.

MOD DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată.

Agitați bine flaconul înainte de utilizare.

Administrați vaccinul astfel:

Bovine: 4 ml în regiunea gâtului

Caprine: 2 ml în regiunea gâtului

Vaccinare primară

Se administrează subcutanat 2 doze la un interval de 3 săptămâni.

Revaccinare

La fiecare 9 luni, așa cum este descris pentru vaccinarea primară, bazată pe durata imunității de 280 zile.

TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE

Carne, organe și lapte: Zero zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare ($+2^{\circ}\text{C}$ și $+8^{\circ}\text{C}$). A se proteja de lumină. A se feri de îngheț.

PARTICULARITĂȚI FARMACOCINETICE

Bovine:

Pentru imunizarea activă a bovinelor, pentru a reduce riscul la animalele neinfectate vaccinate atunci când nu sunt gestante să devină eliminatoare (o probabilitate de 5 ori mai mică în comparație cu animalele care au primit un placebo) și pentru reducerea eliminării de *Coxiella burnetii* prin lapte și mucus vaginal.

Instalarea imunității: nu s-a stabilit.

Durata imunității: 280 de zile de la finalizarea ciclului de vaccinare primară.

Sfaturi practice pentru managementul Febrei Q



Întotdeauna investigați cauzele avorturilor din fermă și problemele de reproducție. Febra Q poate fi implicată!



Păstrați o igienă corespunzătoare în zona de fătare!



Protejați-vă! Purtați mănuși și echipament de protecție când asistați animalele la fătare.



Limitați diseminarea patogenilor în condiții meteo nefavorabile.



Evitați realizarea dezinfecției cu spray-uri cu presiune.



Protejați-vă animalele, profitul și pe dumneavoastră, vaccinând.

Nu îți asuma riscuri care nu sunt necesare! VACCINEAZĂ!