

Ce qu'il faut savoir sur la FIÈVRE Q en 6 points clés

OBJECTIF DE CETTE FICHE :

Partager l'essentiel des connaissances et des réflexes pour se protéger de la fièvre Q

La fièvre Q touche plus d'1 élevage bovin sur 3, 1 élevage ovin sur 2 et près de 2 élevages caprins sur 3¹. Pourtant une étude récente montre que seul 1 éleveur sur 10 perçoit un risque élevé d'introduction de cette maladie dans les élevages². Il semble donc que cette infection soit méconnue et sous-estimée, malgré ses conséquences pour la santé de l'Homme et des troupeaux, et son impact économique. C'est pourquoi les experts du Comité Fièvre Q ont conçu une série d'outils d'information à destination des professionnels de l'élevage. Ces supports pratiques font le point des connaissances et des recommandations afin de favoriser la mise en place de mesures de gestion efficaces.

Les fiches pratiques du Comité Fièvre Q sont disponibles sur les sites de vos organisations professionnelles et sur le site www.comitefievreq.com.



1. Qu'est-ce que la fièvre Q ?

La fièvre Q est une maladie bactérienne affectant de nombreuses espèces animales, dont l'ensemble des espèces de ruminants, mais également l'Homme. On parle de zoonose : l'infection se transmet d'une espèce à l'autre (de l'animal vers l'Homme et inversement).

2. Comment la fièvre Q se transmet-elle à l'Homme et entre les animaux ?

La contamination se réalise essentiellement par voie respiratoire : inhalation d'aérosols de poussières contaminées par des sécrétions génitales, des placentas d'animaux infectés ou des excréments. La contamination par voie orale (par ingestion de lait cru contaminé par exemple) est jugée nulle à négligeable.

3. Comment savoir si la fièvre Q est présente dans mon élevage ?

Chez les ruminants, l'infection est le plus souvent asymptomatique : dans la majorité des cas les ruminants infectés ne présentent pas de signes cliniques, mais excrètent la bactérie.

Dans sa forme clinique, la fièvre Q entraîne principalement des troubles de la reproduction : avortements, mises-bas prématurées et naissance d'animaux chétifs, infertilité possible (métrites, retours en chaleur, rétentions placentaires, baisse des performances).

L'identification de la maladie passe par un suivi sanitaire régulier de l'élevage, la déclaration systématique des avortements (dès le 1^{er} avortement en élevage bovin ; à partir de 3 avortements en 7 jours ou moins en élevages ovin et caprin) et une exploration diagnostique des avortements et des sous-performances de reproduction.

4. Comment protéger mon troupeau et mes animaux de la fièvre Q ?

- Isoler les animaux au moment de la mise-bas ;
- Collecter systématiquement les produits de mise-bas et d'avortement et les déposer dans des sacs ou récipients hermétiques en attendant la visite du vétérinaire, puis éliminer les produits de mise-bas, placentas et avortons par l'équarissage ;
- Vacciner le troupeau en concertation avec le vétérinaire à titre préventif ;
- Dans les cas d'introduction d'animaux dans le troupeau ou de fusion de troupeaux, qui représentent des situations de risques accrus de contamination, effectuer un dépistage sérologique et s'assurer du statut sanitaire du troupeau vendeur (PCR sur lait de tank et/ou PCR environnementales) et de son adéquation avec celui du troupeau acheteur.

5. Mon élevage est atteint de fièvre Q, que faut-il faire ?

- Vacciner les animaux vis-à-vis de la fièvre Q pour limiter les avortements, améliorer la fertilité et diminuer l'excrétion de bactéries par les animaux dans l'environnement ;
- Gérer de façon appropriée les effluents (fumier en particulier) : conditions de stockage à l'abri du vent, bâchage éventuel, manipulation par temps calme et humide, compostage des fumiers et enfouissement immédiat après épandage ;
- Mettre en place des mesures renforcées de biosécurité autour des mises-bas et des avortements (isolement des femelles qui mettent bas, nettoyage et désinfection des locaux et du matériel, port de masque et de gants pour collecter les placentas...).

6. Comment se protéger et protéger ma famille, les salariés et les visiteurs de l'exploitation ?

- Éviter les visites pendant les périodes de mise-bas et, si cela n'est pas possible (mises-bas étalées toute l'année), isoler les femelles qui mettent bas dans un local spécifique interdit d'accès aux visiteurs ;
- Porter des vêtements de protection, bottes, gants et manchettes jetables lors de la manipulation des tissus animaux, en particulier des produits d'avortement ;
- En cas de risque suspecté, porter un dispositif de protection respiratoire tel qu'un masque chirurgical bien ajusté au niveau du visage (qui doit couvrir le nez et la bouche), notamment pour les activités générant des gouttelettes et des poussières ;
- Former et informer les salariés sur les risques liés à la fièvre Q : hygiène, mesures collectives et individuelles de prévention ;
- Vacciner le troupeau à titre préventif en concertation avec le vétérinaire ;
- Pour toute question contacter votre référent à la MSA (Mutualité Sociale Agricole).



Références

- 1 - Gache K., Rousset E., Perrin J.-B., De Cremoux R., Hosteing S., Joudain E., Guatteo R., Nicollet P., Touratier A., Calavas D., Sala C., 2017. Estimation of the frequency of Q fever in sheep, goat, and cattle herds in France: results of a 3-year study of seroprevalence of Q fever and excretion level of *Coxiella Burnetii* in abortive episodes. *Epidemiol. Infect.* 145, 3131-3142
- 2 - Étude de perceptions sur la fièvre Q réalisée par l'Institut ViaVoice auprès de 375 éleveurs, 100 vétérinaires et 100 médecins généralistes en France, pour le Comité Fièvre Q, octobre 2020 ; BEAUDEAU F., POUQUET M., GUATTEO R., BAREILLE N., MORET L. : Risk of seropositivity to *Coxiella burnetii* in humans living in areas with endemically infected cattle : No way for specific prevention. [Zoonoses and Public Health](#)

> Autres fiches pratiques du Comité fièvre Q à destination des éleveurs

- Quand suspecter la fièvre Q chez les bovins ?
- Quand suspecter la fièvre Q chez les petits ruminants ?
- Gestion des risques zoonotiques et accueil du public dans les exploitations



> Fiches pratiques du Comité fièvre Q à destination des vétérinaires

- Quand suspecter la fièvre Q chez les bovins ?
- Quand suspecter la fièvre Q chez les petits ruminants ?
- Quels prélèvements effectuer lors d'avortements chez les bovins en cas de suspicion de fièvre Q ?
- Gestion de la Fièvre Q chez les bovins - Mesures médicales
- Gestion de la Fièvre Q chez les petits ruminants - Mesures médicales
- Gestion de la Fièvre Q chez les bovins - Mesures non-médicales
- Gestion de la Fièvre Q chez les petits-ruminants - Mesures non-médicales



> Sources d'informations utiles sur la fièvre Q

- [Fièvre Q - Mieux la connaître \(GDS France\)](#)
- [Dispositif OSCAR – Observatoire et suivi des causes d'avortements chez les ruminants](#)
- [Plateforme ESA – Epidémiosurveillance santé animale](#)



N'hésitez pas à prendre contact avec votre vétérinaire ou votre groupement de défense sanitaire (GDS).

Comité FIÈVRE Q



www.comitefièvreq.com

Les experts du Comité fièvre Q souhaitent contribuer à la lutte contre cette maladie en France en favorisant l'accès des professionnels à des recommandations concertées en matière de diagnostic et de maîtrise. Complexe et méconnue, très répandue dans les élevages de ruminants, la fièvre Q a en effet des conséquences non négligeables pour la santé animale, les performances des troupeaux et la santé humaine. Le Comité fièvre Q, présidé par le Pr Raphaël Guatteo et par le Dr Christophe Brard, a été créé en janvier 2020 avec le soutien institutionnel de Ceva Santé Animale.

LA COMPOSITION DU COMITÉ EN 2021 : Dr Christophe Brard, Docteur vétérinaire, Président du Conseil d'Administration de la SNGTV • Pr Raphaël Guatteo, Docteur vétérinaire, professeur en médecine bovine à Oniris, enseignant chercheur en épidémiologie • Dr Kristel Gache, Docteur vétérinaire, épidémiologiste, GDS France, animatrice du groupe d'investigation "Fièvre Q" de la Plateforme ESA • Dr Renée de Crémoux, Docteur vétérinaire, Chef de projet Recherche et Développement au Département Qualité des Produits, Bien-Être et Santé, Institut de l'Élevage • Dr Eric Collin, Docteur vétérinaire, Président de la commission épidémiologie de la SNGTV.