

velactis[®]
onde tudo começa!

Nunca foi tão
fácil fazer
secagem!



Velactis®:

O primeiro e único facilitador de secagem

-  Velactis® contém cabergolina (1.12mg/mL).
-  Tratamento em dose única de 5 mL de aplicação intramuscular após a última ordenha.
-  Reduz rapidamente a produção de leite, facilitando a secagem.
-  Permite a secagem abrupta.
-  Permite que se mantenha a mesma nutrição até o momento da secagem.
-  Diminui o aumento do volume (ingurgitamento) e da pressão do úbere, diminuindo a dor e melhorando o bem-estar da vaca.
-  Diminui o vazamento de leite após a secagem permitindo a formação natural do tampão de queratina.
-  Diminui a taxa de novas infecções intramamárias responsáveis pelas mastites que ocorrem no início da próxima lactação.
-  Possibilita o produtor ou técnico definir a duração do período seco de acordo com o manejo da propriedade.
-  Melhora o manejo, a saúde do úbere e o bem-estar da vaca.



Secagem, onde tudo começa!

- 🦠 A secagem marca o início do período seco e começa com a última ordenha.
- 🦠 Durante o período seco, o úbere involui e, posteriormente, se regenera.
- 🦠 A secagem é o princípio da lactação seguinte.
- 🦠 Parte significativa de novas infecções intramamárias adquiridas no período seco continuam na lactação seguinte.
- 🦠 O vazamento de leite após a última ordenha aumenta a suscetibilidade a novas infecções intramamárias.

Objetivos da secagem:


- 🦠 **Melhorar o manejo** reduzindo rapidamente a produção de leite.
- 🦠 **Otimizar a saúde do úbere** para evitar o risco de novas infecções.
- 🦠 **Garantir o bem-estar da vaca** reduzindo a dor e o mal estar causado pelo acúmulo de leite no úbere.



Comprove a eficácia de Velactis®


1. Melhora o manejo

Redução na pressão interna do úbere em 48,9%*



Aumento da pressão do úbere um dia após a secagem quando comparada com quatro dias anteriores à secagem e antes da ordenha.


Redução do ingurgitamento do úbere em 49,3%*



Ingurgitamento do úbere um dia após a secagem quando comparado com quatro dias anteriores à secagem e antes da ordenha.

2. Otimiza a saúde do úbere

Redução do vazamento de leite em 81,3%*



Porcentagem de vacas com vazamento de leite após a secagem


Estudos recentes identificaram as seguintes incidências de vazamento de leite:

Estados Unidos: 32%

México: 24%

Brasil: 30% (dados preliminares)


Redução da taxa de novas infecções intramamárias durante o período seco em 21%*



Porcentagem de quartos com novas infecções

3. Garante melhora no bem-estar da vaca


Redução da dor no úbere após a secagem*



Porcentagem de vacas mostrando dor após a secagem quando comparada com o dia anterior à secagem

Velactis® (D1, D2 e D4) $p < 0,05$ Não tratadas

73,8% a mais no tempo de descanso após a secagem*



Diferença em minutos antes e depois da última ordenha no tempo médio de descanso

*Dados de registro do Velactis® no Ministério da Agricultura

Comparação visual entre vacas tratadas e não tratadas com Velactis® na secagem

Vacas não tratadas


VACA 42120




Antes da última ordenha



Depois da última ordenha



+ 1 dia



+ 2 dias


VACA 42600




Antes da última ordenha



Depois da última ordenha



+ 1 dia



+ 2 dias


O leite se acumula no úbere após a secagem

Vacas tratadas com Velactis®


VACA 2147




Antes da última ordenha



Depois da última ordenha



+ 1 dia




+ 2 dias


VACA 53394




Antes da última ordenha



Depois da última ordenha



+ 1 dia



+ 2 dias

As vacas tratadas com Velactis® acumulam menos leite no úbere e a glândula mamária involui mais rapidamente.



CONSULTE UM MÉDICO VETERINÁRIO



Juntos, além da saúde animal

CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA

www.ceva.com.br

Rua Manoel Joaquim Filho, nº 303

Paulínia, SP | CEP 13 148-115

☎ 0800 770 0355

@ sac@ceva.com