


Velactis[®], Es un facilitador del secado

- Velactis[®] contiene cabergolina (1.12mg/mL).
- Se aplica intramuscularmente en una única dosis de 5mL después del último ordeño.
- Reduce la producción de leche y consecuentemente la presión en la ubre facilitando el secado.
- Mejora el manejo, la salud de la ubre y el bienestar de la vaca lechera.



¡Disponible en
envase individual!

“Maneje el secado con Velactis[®] y
optimice la eficiencia de su hato”



Ahora con Velactis[®] facilite el secado del hato de la manera más eficiente:

- Reduzca la incidencia de goteo de leche.
- Reduzca la incidencia de nuevas infecciones intramamarias*.
- Reduzca el dolor de la ubre y el malestar al secado.

**En vacas infectadas al momento del secado se recomienda el uso del tubo de secado.*

Referencias: (1) datos internos de Ceva.

VELACTIS[®] 1.12 mg/ml. Reg. SAGARPA: Q-7378-041. **USO VETERINARIO.** Solución inyectable para ganado. **FÓRMULA:** Cada ml contiene: Cabergolina: 1.12 mg. Vehículo c.b.p.: 1 ml. **FORMA FARMACÉUTICA:** Solución inyectable. **INDICACIONES:** VELACTIS[®] es un facilitador del secado. Previene la presentación de nuevas infecciones intramamarias, reduce las pérdidas de leche por goteo, así como el dolor y molestias debidas a la inflamación de la ubre (mayor confort para la vaca) durante el periodo seco. **DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:** La dosis recomendada es de 5.6 mg de cabergolina (equivalente a 5 ml de solución) por animal, en una sola inyección por vía intramuscular el día de secado después del último ordeño. **CONTRAINDICACIONES:** No utilizar en caso de hipersensibilidad a la cabergolina o a cualquiera de los ingredientes de la fórmula. En caso de notar algún efecto grave o cualquier efecto no mencionado en el presente instructivo, por favor consulte al Médico Veterinario. **ADVERTENCIAS:** Almacenar a temperatura ambiente (máx. 25°C). Agitar bien antes de su uso. Una vez abierto el envase, el producto puede ser utilizado durante 28 días. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. **PERIODO DE RETIRO:** Carne y vísceras: 23 días. Leche: 0 días. **PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO EN ANIMALES:** El producto se debe administrando siguiendo los procedimientos asépticos para inyección parenteral. Precauciones para el operario: El producto puede causar sensibilidad en la piel. Las mujeres embarazadas y las personas que tengan una hipersensibilidad conocida a los ingredientes de la fórmula, deben evitar el contacto con el producto. En caso de auto-inyección accidental, busque ayuda médica inmediata y muéstrele al médico este instructivo. Lavar las manos después de administrar el producto. El producto se puede usar durante la gestación y lactancia en los animales. No se conocen interacciones con otros medicamentos. **Sobredosis:** En algunos casos, la administración de tres o cinco veces la dosis recomendada durante 3 días consecutivos, dio por resultado la aparición de signos digestivos reversibles como diarrea y un ligero decremento del apetito. **PRESENTACIÓN:** Caja con frasco con 5 ml. Caja con frasco con 25 ml. Caja con frasco con 50 ml. Caja con 5 x5 ml. **CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO. SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. ELABORADO POR:** Ceva Santé Animalé. 10 Avenue de La Ballastière, 33500, Libourne, Francia. **IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:** Ceva Salud Animal, S.A. de C.V. Av. Periférico Sur No. 4829, Oficina 301, Col. Parque del Pedregal, Del. Tlalpan. C.P. 14010, México, D.F. Tel.: (55) 5362 1800. CSA-940420 S91. www.ceva.com.



¡Facilite el secado
de la manera más
eficiente!



El secado, donde todo comienza

- El secado marca el inicio del período seco y comienza con el último ordeño.
- Durante el período seco, la ubre involuciona y se regenera.
- El secado es el principio de la siguiente lactación.

Objetivos del secado:


- Mejorar el manejo reduciendo rápidamente la producción de leche.
- Optimizar la salud de la ubre y evitar el riesgo de nuevas infecciones.
- Garantizar el bienestar animal reduciendo el dolor y malestar causado por la acumulación de leche en la ubre.



Compruebe la eficacia de Velactis®


1. Mejora el manejo

Reducción de la sobrepresión de la glándula mamaria en un 59,1%



* Comparado con el día 4 previo al secado antes el ordeño


Reducción de la congestión de la glándula mamaria en un 49,2%



* Comparado con el día 4 previo al secado antes el ordeño


2. Optimiza la salud de la glándula mamaria

Reducción del goteo de leche* después del secado en un 81,3%




* Un estudio reciente en hatos lecheros en México mostró una incidencia de goteo de leche después del secado del 24%

Reducción de nuevas infecciones intramamarias durante el período seco en un 21%



3. Garantiza el bienestar animal


Reducción del dolor en la ubre después del secado



* Comparado con el día previo al secado

Velactis® (D1, D2 y D4) p<0.05 Control

Mayor tiempo de descanso después del secado (42,4%)



* Antes (referencia) y después del ordeño

Comparación de tratamientos al secado

Estudio de Campo realizado en México

Vacas control



La leche se acumula en la ubre después del secado

Vacas tratadas con Velactis® después del último ordeño



Las vacas tratadas con Velactis® no acumulan leche en la ubre y la glándula mamaria involuciona rápidamente.