


Велактис®

Ваш первый и единственный инструмент для одномоментного запуска коров

1. Содержит каберголин
2. Вводится однократно после последнего доения
3. Облегчает процесс запуска
4. Снижает давление в вымени
5. Упрощает менеджмент при запуске, улучшает здоровье вымени и комфорт коров



“ Велактис оптимизирует менеджмент
молочного поголовья ”



Велактис

когда все только начинается


Применение Велактис облегчает процесс запуска:

-  Сокращает подтекание молока ²
-  Снижает частоту возникновения новых инфекций в вымени ³
-  Устраняет дискомфорт после одномоментного запуска ⁴

1. Field data from USA, Brazil, Mexico and Europe (data unpublished)
2. Internal Study report: CLT/C646/1006
3. Internal Study report: ST-CLT/C646/1007
4. Internal Study report: CLT/C646/1128

Велактис. Международное непатентованное название: каберголин. Состав: в 1 мл в качестве действующего вещества содержит 1,12 мг каберголина, а также вспомогательные вещества: диметилсульфоксид и среднецепочечные триглицериды. Лекарственная форма: раствор для инъекций. Фармакотерапевтическая группа: ингибиторы пролактина. Фармакодинамика: каберголин – синтетическое производное эрголина, агонист дофаминовых D2-рецепторов. Воздействуя на дофаминовые D2-рецепторы лактотропных клеток гипофиза, каберголин подавляет секрецию пролактина, гормона, участвующего в лактогенезе. Таким образом, лактация прекращается. Показания к применению: Велактис применяют коровам при запуске для подавления лактации, уменьшения боли и дискомфорта при набухании вымени, а также для профилактики маститов в сухостойный период. Препарат вводят перед запуском в течение 4 часов после последнего доения. Способы введения и дозировка: однократно внутримышечно в дозе 5 мл на животное, что соответствует дозе каберголина 5,6 мг. Фармакокинетика: после внутримышечного введения каберголин быстро всасывается из места введения, пик концентрации достигается через 3 часа, хорошо распределяется в тканях. Биодоступность каберголина – 90%, связывается с протеинами плазмы более чем на 74%, быстро метаболизируется в печени, период полувыведения составляет около 20 часов. 66% от введенной дозы выводится с фекалиями. Срок годности: 3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – 28 дней. Сроки ожидания: молоко – без ограничений, мясо – не ранее, чем через 23 дня после последнего применения.





Велактис

когда все только начинается



*Для эффективного
одномоментного
запуска*



Сухостойный период когда все только начинается

- 🐮 **Запуск** – это прекращение доения и начало сухостойного периода
- 🐮 **Сухостойный период** – это начало новой лактации
- 🐮 Во время сухостойного периода происходит подготовка молочной железы к новой лактации

Задачи при запуске в сухостойный период:

- 🐮 **Усовершенствовать систему менеджмента** путем быстрого прекращения производства молока
- 🐮 **Улучшить здоровье вымени** и минимизировать риск подтеканий молока и новых инфекций во время сухостойного периода
- 🐮 **Гарантировать комфорт животным** после запуска




Подтекания молока после запуска встречаются более чем у 20% коров ¹


Эффективность применения Велактис!

1. Оптимизирует менеджмент стада в период запуска

Сокращая давление в вымени на 59% ²




Снижая отечность вымени на 49% ²




2. Улучшает здоровье вымени

Уменьшая случаи подтекания молока после запуска на 81% ³




Сокращая вероятность возникновения новых инфекций вымени на 21% ³




3. Повышает комфорт

Снижая болезненность вымени после запуска ⁴



Увеличивая время отдыха в первый день после запуска на 2,35 часа (2 ч 21 мин.) ⁴




Сравнение вымени до и после запуска

Контрольная группа

ЖИВОТНОЕ # 1



Перед последним доением



После последнего доения



+1 день после запуска




+2 дня после запуска


ЖИВОТНОЕ # 2




Перед последним доением



После последнего доения



+1 день после запуска



+2 дня после запуска

Молоко накапливается в вымени после прекращения доения

Группа с применением Велактис

ЖИВОТНОЕ # 1



Перед последним доением



После последнего доения



+1 день после запуска



+2 дня после запуска

ЖИВОТНОЕ # 2



Перед последним доением



После последнего доения



+1 день после запуска



+2 дня после запуска

У коров из группы "Велактис" молоко не накапливается в вымени и животные не испытывают дискомфорт