

Examen fédéral de médecine Répétitoire 2019 - Pédiatrie

Médecin responsable:

Dr Andreas Nydegger

Médecin adjoint

Chef unité gastro-entérologie

Chez une jeune adolescente avec comportement anorexique et vomissements, quelle complication tardive n'est pas à craindre?

- A. Un retard de croissance
- B. Une ostéopénie
- C. Une hyperkaliémie chronique
- D. Une absence de développement mammaire
- E. Une atteinte de l'émail dentaire

Réponse C : une hyperkaliémie chronique

Lequel des aliments suivants est le plus souvent impliqué dans le développement d'une entéropathie d'origine alimentaire chez l'enfant?

- A. Le lait de vache
- B. Le soja
- C. Les céréales
- D. Les noix
- E. Les œufs

Réponse A : le lait de vache

Le diagnostic de maladie cœliaque vient d'être posé chez un enfant de 17 mois. Un régime sans gluten et sans lactose est prescrit. Lequel des aliments suivants est encore permis?

- A. Le yoghourt
- B. Le riz
- C. Les pâtes
- D. Le poisson pané
- E. La soupe aux flocons de seigle

Réponse B : le riz

Les douleurs abdominales fonctionnelles récidivantes de l'enfant ont pour caractéristique clinique d'être :

- A. Péri-ombilicales
- B. Nocturnes
- C. Accompagnées d'une perte de poids
- D. Associées à des vomissements répétés
- E. Accompagnées d'une diarrhée

Réponse A : péri-ombilicales

Quel est l'agent des maladies virales suivantes qui entraîne le plus souvent une atteinte du pancréas?

- A. Virus de l'influenza A
- B. Virus des oreillons
- C. Virus de la varicelle
- D. Virus de la rougeole
- E. Virus ECHO du type A

Réponse B : virus des oreillons

Laquelle des affirmations concernant l'alimentation du prématuré n'est pas correcte?

- A. Le nombre des repas devrait être adapté à l'enfant, au nombre de 8 à 24 par jour.
- B. En cas de trouble de la succion, il est possible d'utiliser une sonde nasogastrique.
- C. La quantité totale de lait à atteindre par jour correspond au 1/6e du poids corporel.
- D. En cas de perte de poids durant la première semaine de vie, il convient d'augmenter les quantités de lait habituellement prescrites.
- E. En présence d'une contre-indication à l'alimentation (par ex: entérocolite), on doit passer à une alimentation parentérale.

Réponse D

Dans le cadre d'une mucoviscidose, les vitamines suivantes sont potentiellement mal absorbées, à l'exception de :

- A. La vitamine A
- B. La vitamine B12
- C. La vitamine D
- D. La vitamine E
- E. La vitamine K

Réponse B : la vitamine B12

Parmi les énoncés suivants, lequel ne correspond pas à une sténose hypertrophique du pylore?

- A. Le rapport entre garçons et filles est de 1 / 5.
- B. Le début des symptômes survient en règle générale entre 2 et 5 semaines.
- C. Le nourrisson vomit en jet.
- D. La sténose du pylore entraîne une alcalose hypochlorémique.
- E. Elle peut être identifiée par ultrasonographie.

Réponse A

Concernant la malabsorption des monosaccharides (glucose-galactose), toutes les affirmations suivantes sont justes, sauf :

- A. Activité disaccharidasique intestinale normale
- B. Sévère diarrhée aqueuse lors d'ingestion de lait de vache
- C. Sévère diarrhée aqueuse lors d'ingestion de glucose
- D. Présence d'une constipation lors d'ingestion de glucose

Réponse D

Chacun des agents pathogènes suivants peut causer une hépatite chez l'enfant, sauf :

- A. *Brucella melitensis*
- B. Virus Epstein-Barr
- C. Cytomégalo virus
- D. *Haemophilus influenzae*
- E. Adénovirus

Réponse D : *Haemophilus influenzae*

Lors de quelle infection de la grossesse, une vaccination chez le nouveau-né est indiquée?

- A. Hépatite A
- B. Streptocoques B
- C. Rubéole
- D. Hépatite B
- E. Varicelle

Réponse D : Hépatite B

- A. Ictère au lait maternel
- B. Incompatibilité de groupe sanguin
- C. Septicémie bactérienne
- D. Atrésie des voies biliaires
- E. Hépatite B

Un nouveau-né à terme présente au 14^e jour de vie un ictère. Parmi les diagnostics différentiels ci-dessus, en faveur duquel parlent les constatations ci-dessous?

- Peau de couleur jaune
- Bon état général
- Augmentation de la bilirubine non conjuguée dans le sang

Réponse A : ictère au lait maternel

- A. Ictère bien visible à 8 h de vie
- B. Macrosomie
- C. Pléthore
- D. Convulsions apparaissant à 24 h de vie
- E. Retard d'évacuation du méconium

Attribuez le symptôme correspondant à la maladie :

- Incompatibilité foeto-maternelle

Réponse A : ictère bien visible à 8 h de vie

La supplémentation en vitamine K à la naissance est recommandée pour :

- A. Les nouveau-nés hypotrophiques
- B. Les nouveau-nés prématurés
- C. Les nouveau-nés présentant une cholestase
- D. Les nouveau-nés présentant une diathèse hémorragique
- E. Tous les nouveau-nés

Réponse E : Tous les nouveau-nés

Une intoxication sévère au paracétamol (acétaminophène) peut entraîner une insuffisance :

- A. Cardiaque
- B. Hépatique
- C. Pancréatique
- D. Pulmonaire
- E. Rénale

Réponse B : Hépatique

Une fillette de 3 ans est amenée aux urgences après avoir possiblement ingéré 45 minutes plus tôt 8 tablettes de paracétamol à 500 mg :

- A. L'administration par voie orale de charbon actif
- B. L'administration d'un émétique
- C. L'organisation d'un lavage gastrique
- D. L'administration de Naloxone
- E. L'administration d'un laxatif

Réponse A : L'administration par voie orale de charbon actif

Le lait maternel peut contenir les substances suivantes, sauf :

- A. Le VIH
- B. La nicotine
- C. L'IgA (immunoglobuline A)
- D. Le fructose
- E. Le DDT (pesticide)

Réponse D : Le fructose

Quelle affirmation concernant l'invagination intestinale chez l'enfant n'est pas caractéristique?

- A. Début de l'affection avec douleurs violentes, l'enfant se tord et il est pâle.
- B. Après les premières crises douloureuses, s'intercalent des périodes peu symptomatiques pendant lesquelles l'abdomen est souple.
- C. Lors du toucher rectal, détection de mucus sanguinolent.
- D. Une invagination récente peut être réduite par un lavement avec produit de contraste.
- E. Elle survient en règle générale chez l'enfant d'âge scolaire.

Réponse E

Les manifestations cliniques suivantes font partie de l'infestation à ascaris chez l'enfant, sauf :

- A. La pancréatite
- B. La lymphocytose
- C. L'infiltration pulmonaire
- D. L'iléus
- E. La cholécystite

Réponse B : la lymphocytose

Laquelle des propositions ci-dessous concernant la croissance staturo-pondérale est incorrecte?

- A. La taille de naissance d'un garçon est plus grande que celle d'une fille.
- B. A 6 mois, le poids de l'enfant a doublé par rapport au poids de naissance.
- C. A 12 mois, le poids de l'enfant a quadruplé par rapport au poids de naissance.
- D. A 12 mois, la taille de l'enfant se situe à une fois et demi celle de la naissance.
- E. A 12 mois, la taille de l'enfant correspond environ à 50% de la taille adulte.

Réponse C