


Coordonner les symptômes aux causes :

Symptômes :

1. Langue framboisée
2. Langue vernissée, rouge, sèche
3. Enduit blanc, non adhérent, sur la langue
4. Coloration bleu-vert des gencives
5. Langue brillante, lisse, tachetée de rouge

Causes :

- A. Maladie de Sjögren
- B. Scarlatine
- C. Anémie de Biermer
- D. Intoxication par le plomb
- E. Candidose



Un enduit adhérent gris-sale sur la muqueuse buccale est en faveur de :

- A.** Scarlatine
- B.** Diphtérie
- C.** Thyphus
- D.** Moniliase
- E.** Rougeole






Coordonner le type de pharyngite aux signes cliniques :

type :

1. Angine de Vincent
2. Pharyngite de l'agranulocytose
3. Herpangine
4. Angine diphtérique
5. Angine de la scarlatine

Signes :

- A. Amygdale rouge-sombre, streptocoque hémolytique de type A
- B. Ulcération unilatérale avec membrane blanche
- C. Membrane adhérente, grise, s'étendant en dehors des amygdales
- D. Amygdale ulcérée, modifications sanguines typiques
- E. Vésicules fugaces autour des amygdales.



La tumeur la plus fréquente de la lèvre inférieure est un :

- A.** Adénocarcinome
- B.** Carcinome anaplasique (lymphoépithéliome)
- C.** Mélanome
- D.** Carcinome spinocellulaire
- E.** sarcome

La localisation tumorale la plus fréquente de la langue est :


- A. La pointe de la langue
- B. Le bord latéral de la langue
- C. La base de langue
- D. Le dos de la langue
- E. La langue et le plancher buccal simultanément

Lequel des signes suivants est caractéristique d'une paralysie unilatérale du nerf grand hypoglosse :

- A.** Attraction du voile du palais du côté sain
- B.** Enrouement
- C.** Déviation de la langue du côté sain
- D.** Déviation de la langue du côté paralysé
- E.** Dysphagie

Un abcès descendant, un emphysème, etc., peuvent s'étendre dans la loge comprise entre les aponévroses cervicales moyenne et profonde vers le médiastin (1), *parce que* cette loge communique avec le médiastin (2).

- A. Énoncés 1 + 2 exacts, relation exacte
- B. Énoncés 1 + 2 exacts, relation fausse
- C. Énoncé 1 exact, 2 faux
- D. Énoncé 1 faux, 2 exact
- E. Énoncés 1 + 2 faux



Le ganglion de Troisier

- A. A une fonction endocrine
- B. Est situé à la base du cou à droite
- C. Est un chémodectome
- D. Est une métastase au cou, du côté gauche, et est un signe de dissémination maligne au cours, par ex., d'un carcinome abdominal, gynécologique ou thoracique
- E. Est du tissu salivaire ectopique

Une tumeur cervicale latérale est le plus vraisemblablement un carcinome branchiogène (1), *parce que* les carcinomes se développent souvent dans les kystes branchiques (2)

- A.** Énoncés 1 + 2 exacts, relation exacte
- B.** Énoncés 1 + 2 exacts, relation fausse
- C.** Énoncé 1 exact, 2 faux
- D.** Énoncé 1 faux, 2 exact
- E.** Énoncés 1 + 2 faux