

Examen fédéral de médecine Répétitoire 2019 - Pédiatrie

Médecin responsable:

Dr Jean-Baptiste Armengaud

Médecin hospitalier

Département femme-mère-enfant (DFME)

Qu'est-ce-qui n'est pas caractéristique des céphalées dues à une tumeur cérébrale :

- A. L'accompagnement par un sentiment de vertige
- B. L'aggravation par la toux
- C. La survenue nocturne ou matinale
- D. L'accompagnement par des vomissements
- E. Le caractère pulsatile

Réponse E : le caractère pulsatile

Lequel des symptômes et signes cliniques suivants n'est pas caractéristique de la polyradiculonévrite aiguë (syndrome de Guillain-Barré) ?

- A. Des paresthésies au niveau des jambes
- B. Une aréflexie
- C. Une parésie faciale bilatérale
- D. Une faiblesse asymétrique des membres inférieurs
- E. Une hypo- ou hypertension artérielle

Réponse D : faiblesse asymétrique des membres inf.

- A. Une pneumonie
- B. Une aspiration méconiale
- C. Une maladie des membranes hyalines
- D. Une atrésie de l'oesophage avec fistule trachéo-oesophagienne
- E. Une rubéole congénitale

Quelle cause de détresse respiratoire néonatale est à suspecter en premier lieu en présence des symptômes et signes suivants ?

Nouveau-né prématuré, âge gestationnel de 32 semaines, syndrome de détresse respiratoire augmentant en intensité dans les heures qui suivent la naissance

Réponse C

Hydramnios, sécrétions mousseuses au niveau de la bouche, ballonnement abdominal

Réponse D

Nouveau-né à terme, rupture de la poche des eaux 5 jours avant la naissance, fièvre chez la mère

Réponse A

Nouveau-né à terme, score d'Apgar 3 à 5 minutes, liquide amniotique teinté en vert

Réponse B

Un nouveau-né à terme présente au 14^e jour de vie un ictère. La peau est de couleur jaune, l'état général est bon, il y a une augmentation de la bilirubine non conjuguée dans le sang. Quel diagnostic est le plus probable ?

- A. Ictère au lait maternel
- B. Incompatibilité de groupe sanguin
- C. Septicémie bactérienne
- D. Atrésie des voies biliaires
- E. Hépatite B

Réponse A : ictère au lait maternel

La trisomie 21 (syndrome de Down) est le plus fréquemment causée par :

- A. Une translocation chromosomique non-balancée familiale
- B. Une rupture chromosomique
- C. Une non-disjonction méiotique d'un gamète parental
- D. Un crossing-over au cours de la méiose d'un gamète parental
- E. Aucune de ces possibilités

Réponse C

Parmi les déficits enzymatiques suivants, lequel n'est pas détecté par le test de Guthrie ?

- A. Biotinidase
- B. Galactose 1P-uridyltransférase
- C. Lactase
- D. Phénylalanine hydroxylase
- E. 21-hydroxylase

Réponse C : lactase

Quelle maladie est transmise selon le mode autosomique récessif ?

- A. Tétralogie de Fallot
- B. Neurofibromatose de Recklinghausen
- C. Myéloméningocèle
- D. Phénylcétonurie
- E. Hémophilie A

Réponse D : phénylcétonurie

La présence d'un phimosis :

- A. Nécessite une correction chirurgicale avant l'âge de 1 an
- B. Favorise la survenue d'une balanite
- C. Est la cause fréquente d'une rétention urinaire
- D. Doit faire rechercher une malformation urologique
- E. Est souvent associée à une rétention testiculaire

Réponse B : favorise la survenue d'une balanite

Le premier signe de puberté chez le garçon est :

- A. L'apparition de la pilosité axillaire
- B. L'apparition de la pilosité pubienne
- C. Le changement de voix
- D. La soudure des cartilages de conjugaison
- E. L'augmentation du volume des testicules

Réponse E : l'augmentation du volume des testicules

Qu'est-ce qui ne fait pas partie des signes d'un rachitisme carentiel diagnostiqué au stade initial :

- A. Chapelet costal
- B. Elargissement des métaphyses
- C. Hypotonie musculaire
- D. Appositions périostales
- E. Concentration normale du calcium plasmatique

Réponse D : appositions périostales

Au 1^e jour de vie, un nourrisson atteint de galactosémie présente :

- A. Un ictère
- B. Des vomissements
- C. Une léthargie
- D. Une cataracte bilatérale
- E. Aucun de ces symptômes

Réponse E : aucun de ces symptômes

A propos de la phénylcétonurie laquelle des affirmations suivantes est exacte ?

- A. Elle est l'affection génétique la plus fréquente en Suisse
- B. Elle se manifeste par une hépatosplénomégalie et des traits grossiers
- C. Elle se caractérise par une cétose marquée
- D. Un taux de phénylalanine élevé est tératogène
- E. On débute son traitement uniquement lors de signes cliniques avérés

Réponse D

Parmi les réflexes énumérés ci-dessous, lequel n'est pas présent chez le nouveau-né normal ?

- A. Le réflexe de Moro
- B. La marche automatique
- C. Le réflexe tonique asymétrique du cou (réflexe de l'escrimeur)
- D. Le réflexe du parachute
- E. Le grasping palmaire et plantaire

Réponse D : le réflexe du parachute

Un petit garçon de 14 mois arrive en Suisse avec sa famille comme réfugié d'un pays de l'Europe de l'Est. Il est nourri presque exclusivement au sein par sa mère épuisée par 5 grossesses rapprochées. L'enfant est à risque de présenter :

- A. Une anémie microcytaire marquée
- B. un kwashiorkor
- C. un marasme sévère
- D. une xérophtalmie
- E. un retard du développement psychomoteur

Réponse A : une anémie microcytaire marquée

Un enfant de 6 mois présente un retard important du développement moteur, le contact par le regard est bon, il y a une absence des réflexes ostéotendineux.
La cause la plus probable est :

- A. Une maladie neuromusculaire
- B. Un status après asphyxie périnatale
- C. Un trouble moteur d'origine cérébrale
- D. Une maltraitance
- E. Une ostéogénèse imparfaite

Réponse A : une maladie neuromusculaire

Laquelle de ces anomalies n'appartient pas au syndrome de Turner ?

- A. Une petite taille
- B. Un oedème du dos de la main et du pied chez le nouveau-né
- C. Une malformation rénale
- D. Une hyperthyroïdie
- E. Une malformation cardiaque

Réponse D : une hyperthyroïdie

Laquelle des affirmations suivantes ne s'applique pas à une maladie transmise selon le mode héréditaire autosomique dominant ?

- A. La maladie se transmet par le biais d'un allèle dominant.
- B. Des personnes des deux sexes peuvent être atteintes par cette pathologie.
- C. Un homme atteint peut transmettre une telle maladie à ses fils.
- D. Lorsqu'un des parents est phénotypiquement malade, une partie de leurs enfants peut aussi théoriquement l'être.
- E. Une personne phénotypiquement indemne peut transmettre la maladie en question.

Réponse E

Les signes cliniques suivants sont caractéristiques d'un rachitisme, sauf :

- A. Le craniotabès
- B. Le chapelet costal
- C. Le genu varum
- D. L'élargissement des métaphyses
- E. La fracture

Réponse E : la fracture

Dans l'insuffisance cardiaque du nourrisson, qu'observe-t-on le moins fréquemment ?

- A. Une polypnée
- B. Un oedème des chevilles
- C. Une tachycardie
- D. Une hépatomégalie
- E. Des difficultés alimentaires

Réponse B : un oedème des chevilles

Un trouble de la croissance avec un ralentissement net de la vitesse de croissance ne peut pas être dû à :

- A. Des facteurs psychosociaux
- B. Une maladie coeliaque
- C. Une insuffisance rénale chronique
- D. Un asthme chronique
- E. Une anomalie chromosomique XXY

Réponse E : Une anomalie chromosomique XXY

Lequel des facteurs biologiques psychosociaux et familiaux ne joue qu'un rôle insignifiant dans la pathogenèse de l'anorexie mentale ?

- A. Région urbanisée, industrialisée avec standard de vie élevé
- B. Couche sociale moyenne ou supérieure
- C. Famille dont la façon de communiquer est rigide tendant à éviter les conflits
- D. Perte inattendue d'un parent
- E. Processus de maturation physique et psychosocial au cours de la puberté

Réponse D : perte inattendue d'un parent

Lequel des buts énumérés ne concerne pas principalement les mesures pédago-thérapeutiques précoces chez les enfants avec un retard psychomoteur ?

- A. Eviter une sur- ou une sous-stimulation par les parents
- B. Promouvoir l'apprentissage et l'utilisation maximum des capacités intellectuelles
- C. Eviter les perturbations secondaires
- D. Intégrer l'enfant dans un groupe au jardin d'enfants
- E. Préparer l'intégration à l'école primaire

Réponse E : préparer l'intégration à l'école primaire

Quel symptôme ne s'observe en règle générale pas lors d'une tumeur du cervelet :

- A. Raideur de la nuque
- B. Papille de stase
- C. Paralysie du 6ème nerf crânien (abducens)
- D. Posture inclinée de la tête
- E. Crise d'épilepsie focale

Réponse E : crise d'épilepsie focale

Par quelle mesure peut-on prévenir un coma diabétique qui est sur le point de se déclarer ?

- A. Augmenter les apports de liquide
- B. Arrêter l'alimentation
- C. Réinjecter de l'insuline à action rapide
- D. Augmenter la fréquence des autocontrôles par le patient
- E. Aucune des mesures mentionnées

Réponse C : réinjecter de l'insuline à action rapide

Une thrombopénie chez l'enfant entraîne le plus souvent :

- A. Une épistaxis
- B. Une hématurie
- C. Des pétéchie
- D. Un melaena
- E. Un saignement des gencive

Réponse C : des pétéchie

Un enfant de 8 ans qui reçoit des anticonvulsivants depuis 3 ans fait un état de mal épileptique.

La première mesure à prendre est :

- A. L'électroencéphalographie
- B. L'essai de traitement médicamenteux par voie rectale ou intraveineuse
- C. La prise de sang pour dosage des médicaments anticonvulsivants
- D. D'éviter la morsure de la langue par l'insertion d'une spatule entre les dents
- E. D'éviter une hypoxie par l'administration d'oxygène

Réponse B

Un enfant de 10 mois avec un développement normal n'a pas encore de dent. Que décidez-vous ?

- A. De doser la phosphatase alcaline
- B. De doser le calcium et le phosphore
- C. De ne rien faire
- D. De l'envoyer chez le dentiste
- E. De demander une radiographie des mâchoires

Réponse C : de ne rien faire

Dans l'hémophilie A, les paramètres de laboratoire suivants sont normaux, sauf :

- A. Le temps de thromboplastine partielle (aPTT)
- B. Le temps de saignement
- C. Le temps de prothrombine (Quick)
- D. Le nombre de thrombocytes
- E. L'agrégation plaquettaire

Réponse A : le temps de thromboplastine partielle

Au cours de quelle parasitose, le malade peut-il se réinfester immédiatement par des œufs expulsés ?

- A. *Ascaris lumbricoides*
- B. *Oxyuris vermicularis*
- C. *Taenia saginata*
- D. *Diphyllobothrium latum*
- E. *Ankylostoma duodenale*

Réponse B : *oxyuris vermicularis*

Quel laboratoire est typique d'enfant présentant un diabète insulino-dépendant inaugural ?

- A. pH 7.14, pCO₂, 20.9 mmHg, HCO₃⁻ 16.9 mmol/l Na⁺ 163 mmol/l, K⁺ 3.0 mmol/l, Cl⁻ 128 mmol/l
- B. B.pH 7.51, pCO₂, 46.5 mmHg, HCO₃⁻ 36.0 mmol/l Na⁺ 124 mmol/l, K⁺ 2.8 mmol/l, Cl⁻ 72 mmol/l
- C. C.pH 7.12, pCO₂, 40 mmHg, HCO₃⁻ 12.6 mmol/l Na⁺ 118 mmol/l, K⁺ 7.3 mmol/l, Cl⁻ 85 mmol/l
- D. D.pH 7.18, pCO₂, 58 mmHg, HCO₃⁻ 20 mmol/l Na⁺ 131 mmol/l, K⁺ 4.0 mmol/l, Cl⁻ 100 mmol/l
- E. E.pH 7.10, pCO₂, 23 mmHg, HCO₃⁻ 6.9 mmol/l Na⁺ 128 mmol/l, K⁺ 4.0 mmol/l, Cl⁻ 105 mmol/l

Réponse E

Qu'est-ce qui est typique d'une intoxication aux salicylés ?

- A. L'hypernatrémie
- B. L'hypokaliémie
- C. L'acidose respiratoire
- D. L'acidose métabolique
- E. L'alcalose métabolique

Réponse D

Une alcalose métabolique peut être due à toutes les étiologies suivantes, sauf une :

- A. Sténose hypertrophique du pylore
- B. Vomissements incoercibles
- C. Suites opératoires d'une péritonite avec aspiration nasogastrique continue
- D. Diabète sucré décompensé
- E. Mucoviscidose

Réponse D : diabète sucré décompensé

Fille de 10 ans avec petite taille harmonieuse, quelques naevi pigmentaires et un raccourcissement des 4e métacarpiens.
Quel est l'examen le plus approprié pour poser le diagnostic ?

- A. Le dosage de l'hormone de croissance
- B. L'échographie abdominale
- C. Le dosage des oestrogènes
- D. Le caryotype
- E. Le bilan radiologique du squelette

Réponse D : le caryotype

Un nourrisson âgé de 1 mois présente une hypertrophie clitoridienne.

Quel diagnostic n'entre pas en ligne de compte ?

- A. Syndrome adrénogénital
- B. Tumeur hypophysaire
- C. Tumeur de la mère produisant des androgènes
- D. Prise par la mère de substances anaboliques
- E. Tumeur cortico surrénale

Réponse B : tumeur hypophysaire

Laquelle des propositions suivantes, concernant une méningite bactérienne aiguë, est fausse ?

- A. L'*Haemophilus influenzae* de type b, autrefois agent pathogène le plus fréquent est devenu très rare depuis l'introduction de la vaccination contre ce germe dans le programme de vaccination de base.
- B. Les méningites à *Haemophilus influenzae* non typables (non encapsulés) sont devenues plus fréquentes depuis l'introduction de la vaccination contre *Haemophilus influenzae* de type b.
- C. Après la période néonatale, ce sont les pneumocoques et les méningocoques qui sont responsables de la majorité des cas de méningite bactérienne.
- D. Il existe des vaccins dirigés contre les pneumocoques et les méningocoques du groupe C.
- E. La complication résiduelle la plus fréquente d'une méningite à pneumocoques est la surdité de perception.

Réponse B

Les signes cliniques suivants font partie des critères majeurs du syndrome adéno-cutanéomuqueux (syndrome de Kawasaki), à l'exception de :

- A. Fièvre élevée de plus de 5 jours
- B. Grosse adénopathie cervicale
- C. Bronchite asthmatiforme
- D. Exanthème polymorphe
- E. Erythème et desquamation palmoplantaire

Réponse C : bronchite asthmatiforme

Lors d'un premier épisode de convulsion chez le petit enfant on se pose toujours la question du risque du développement ultérieur d'une épilepsie. Lequel des facteurs suivants n'est pas considéré comme un facteur de risque ?

- A. Anamnèse familiale d'épilepsie
- B. Convulsions fébriles complexes
- C. Anomalies neurologiques
- D. Anamnèse familiale de convulsions fébriles
- E. Etat de mal épileptique

Réponse D : anamnèse familiale de convulsions fébriles

A propos de la prise en charge des anorexies mentales, quelle affirmation est fausse ?

- A. Il s'agit d'une maladie chronique potentiellement mortelle.
- B. Une prise en charge à la fois somatique et psychiatrique s'impose.
- C. On retrouve fréquemment une dysmorphophobie.
- D. Le traitement en milieu hospitalier est indispensable.
- E. Chez les jeunes anorexiques, la prise en charge de la famille est primordiale.

Réponse D

Les affirmations suivantes concernant la déficience mentale sévère chez l'enfant sont correctes, sauf une :

- Elle se manifeste souvent par un retard de développement moteur et de langage.
- Il y a souvent des signes dysmorphiques associés.
- La prévalence est d'environ 3 à 4 sur 1'000 enfants.
- Les causes liées à une asphyxie néonatale sont plus fréquentes que les causes génétiques.
- L'hypothyroïdie congénitale en est une cause traitable.

Réponse D

La migraine ne peut pas être accompagnée du symptôme suivant :

- A. Etat confusionnel
- B. Parésie motrice
- C. Céphalées persistantes pendant plusieurs semaines
- D. Troubles neurovégétatifs
- E. Céphalées diffuses

Réponse C

Quelle est la probabilité qu'un enfant sain, né de parents porteurs hétérozygotes du gène d'une maladie autosomale récessive à manifestations cliniques sévères (comme par exemple la fibrose kystique) soit également porteur hétérozygote de ce gène ?

- A. 25 %
- B. 33 %
- C. 50 %
- D. 66 %
- E. 100 %

Réponse D : 66 %

Un enfant avec une épilepsie :

- A. Doit être dispensé de toutes activités sportives scolaires en raison du risque de blessure lors d'une convulsion
- B. Ne doit prendre part qu'aux exercices de gymnastique légers afin d'éviter une crise provoquée par l'hyperventilation
- C. Ne doit pas prendre part à un camp scolaire afin d'éviter une possible privation de sommeil
- D. Doit être spécialement observé et surveillé pendant les cours de natation à la piscine
- E. Ne doit pas faire du vélo

Réponse D : spécialement observé et surveillé

La fibrose cystique (mucoviscidose) est transmise selon le mode héréditaire suivant :

- A. Autosomal dominant
- B. Récessif lié au chromosome X
- C. Autosomal récessif
- D. Dominant lié au chromosome X
- E. Multifactoriel

Réponse C : autosomal récessif

Lequel des énoncés suivants est caractéristique du nanisme psychosocial ?

- A. Une sécrétion d'hormone de croissance dans les normes lors des épreuves de stimulation.
- B. Une reprise de la croissance lors de la séparation de l'enfant d'avec son milieu.
- C. Il se ramène à une carence dans l'apport nutritionnel.
- D. Il est déclenché par la séparation ou par l'abandon.
- E. Aucun des énoncés ci-dessus n'est juste.

Réponse B