

Examen fédéral de médecine Répetitoire 2019 - Pédiatrie

Médecin responsable:

Dre Kathryn LAINE

Cheffe de clinique

Département femme-mère-enfant (DFME)

L'impétigo de l'enfant est une maladie causée par :

- A. Le staphylocoque et le streptocoque
- B. Une piqûre d'insecte
- C. Une réaction auto-immune
- D. L'application d'un produit externe
- E. Un virus

Réponse A : le staphylocoque et le streptocoque



Une splénectomie représente le traitement de choix de l'affection hématologique suivante :

- A. Une sphérocytose héréditaire
- B. Un purpura thrombocytopénique aigu
- C. Un purpura de Henoch-Schoenlein
- D. Une anémie falciforme
- E. Un déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase (G-6-PD)

Réponse A : une sphérocytose héréditaire

La forme la plus fréquente de leucémie de l'enfant est :

- A. Leucémie myéloïde chronique juvénile
- B. Leucémie aiguë lymphoblastique
- C. Leucémie lymphatique chronique
- D. Leucémie aiguë myéloïde
- E. Leucémie "chevelue" ("Hairy-cell leukemia")

Réponse B : Leucémie aiguë lymphoblastique

Un bébé de 6 mois est amené aux urgences pour une toux et un rhume. Il est né prématurément après 27 semaines de gestation et est retourné à domicile après 10 semaines d'hospitalisation sous oxygénothérapie pendant encore 2 mois supplémentaires. Sa famille rentre d'une semaine à la montagne et son grand frère a le rhume. Le bébé est à jour avec ses vaccinations. A l'admission, l'infirmière remarque que le bébé devient cyanosé pendant les pleurs avec une saturation en oxygène de 70 % et une fréquence cardiaque de 80 par minute suivi d'une récupération spontanée en quelques minutes avec une saturation en oxygène de 90 % et une fréquence cardiaque de 140 par minute. A l'examen physique, la fréquence respiratoire est de 82 par minute et des râles inspiratoires humides sont auscultés sur les deux plages pulmonaires. Le diagnostic le plus probable est une :

- A. Coqueluche
- B. Bronchiolite à virus respiratoire syncytial (VRS)
- C. Bronchite obstructive
- D. Pneumonie
- E. Aspiration de corps étranger

Réponse B : bronchiolite à virus respiratoire syncytial

Concernant les polypes nasaux du petit enfant, qu'elle affirmation, parmi les suivantes, est exacte ?

- A. Ils sont un signe d'hyperplasie adénoïdienne.
- B. Ils indiquent une allergie sous-jacente.
- C. Ils sont un signe-clé d'une mucoviscidose.
- D. Ils sont souvent associés à une déviation de la cloison nasale.
- E. Ils traduisent une malformation

Réponse C : signe-clé d'une mucoviscidose

Quel est le premier signe d'un trouble du développement somatique chez un nourrisson ?

- A. Un retard de l'âge osseux
- B. Des douleurs abdominales
- C. Une croissance (prise de taille) insuffisante
- D. Une prise de poids insuffisante
- E. La chute des cheveux

Réponse D : une prise de poids insuffisante

Des malformations congénitales peuvent survenir à la suite de la consommation par la mère, en cours de grossesse, des produits suivants, sauf :

- A. Ethanol
- B. Thalidomide
- C. Antiépileptiques
- D. Nicotine ou Haschisch
- E. Acide rétinoïque

Réponse D : nicotine ou Haschisch

Tous les signes suivants se retrouvent à la fois dans l'hypothyroïdie congénitale et dans la trisomie 21 (syndrome de Down), sauf :

- A. L'hypotonie musculaire
- B. La présence de petites taches blanches dans l'iris
- C. L'hernie ombilicale
- D. La langue protubérante
- E. La peau sèche

Réponse B : petites taches blanches dans l'iris

Par définition, les enfants nés prématurément ont un âge gestationnel inférieur à :

- A. 28 semaines
- B. 32 semaines
- C. 35 semaines
- D. 37 semaines
- E. 40 semaines

Réponse D : 37 semaines

Laquelle des caractéristiques suivantes ne s'applique pas à la maladie des membranes hyalines ?

- A. Résistance vasculaire pulmonaire élevée
- B. Hyperinflation pulmonaire
- C. Augmentation de la PaCo₂ et chute de la PaO₂
- D. Réouverture du canal artériel
- E. Gémissement expiratoire

Réponse B : hyperinflation pulmonaire

Un garçon de 8 ans présente depuis 6 mois, toux et dyspnée après des efforts physiques de longue durée. Depuis qu'il inhale un bêta2-mimétique avant les efforts, il reste asymptomatique. Depuis 3 mois, les mêmes symptômes surviennent aussi lors de temps froid et de brouillard ainsi que lors de refroidissement, et ceci malgré des inhalations supplémentaires du bêta2-mimétique. Un bilan allergologique (Prick-tests cutanés) était négatif. Quelle mesure thérapeutique préconisez-vous?

- A. Doubler la dose du bêta2-mimétique à chaque inhalation
- B. Administrer un bêta2-mimétique à longue durée d'action
- C. Passer à un traitement de théophylline retard
- D. Aucun changement en attendant le printemps
- E. Inhalations prophylactiques d'un corticoïde topique en plus

Réponse E

Comment traitez-vous, chez un nourrisson, un premier épisode de bronchite obstructive aiguë (asthmatiforme) qui se présente sans signe d'insuffisance respiratoire?

- A. Aux antibiotiques
- B. A l'hydratation suffisante et éventuellement des bêta2-sympathomimétiques par inhalation
- C. Aux corticostéroïdes pendant 6 jours
- D. Aux mucinolytiques (p.ex. Fluimucil®, Mucosolvon®)
- E. A l'aminophylline intraveineuse

Réponse B



Laquelle des maladies suivantes ne fait pas partie du screening du nouveau-né en Suisse (test de Guthrie)?

- A. La phénylcétonurie
- B. Trouble du cycle de l'urée
- C. Le syndrome adrénogénital
- D. La mucoviscidose (fibrose kystique)
- E. L'hypothyroïdie

Réponse B

Les affirmations suivantes sur l'angine à streptocoques du groupe A sont exactes, sauf :

- A. L'érythromycine peut, en cas d'allergie, remplacer la pénicilline
- B. Un traitement à la pénicilline permet d'empêcher la fièvre rhumatismale
- C. Elle ne se rencontre que très rarement chez le nourrisson
- D. Elle peut être diagnostiquée avec certitude en examinant les amygdales
- E. Une glomérulonéphrite post infectieuse peut survenir malgré une antibiothérapie adéquate

Réponse D

Le diagnostic de la maladie de Kawasaki inclut les signes cliniques et/ou biologiques majeurs suivants, sauf :

- A. Une fièvre de plus de 5 jours
- B. Une conjonctivite bilatérale
- C. Une thrombocytose
- D. Une encéphalite
- E. Des anévrismes coronariens

Réponse D : une encéphalite

Sont des pathogènes communs de méningite communautaire aigue, SAUF:

- A. *Streptococcus pneumoniae*
- B. *Neisseria meningitidis*
- C. *Haemophilus influenzae* B
- D. enterovirus
- E. cytomegalovirus

Réponse E: Cytomegalovirus

Lors d'une épiglottite aiguë sévère, quelle est la mesure d'urgence la plus importante ?

- A. La tente à oxygène
- B. Les antibiotiques
- C. Les calmants
- D. L'intubation
- E. Les corticostéroïde

Réponse D : l'intubation

Au sujet des convulsions fébriles simples, laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

- A. Elles sont fréquentes entre 3 et 6 mois.
- B. Elles durent le plus souvent plus de 15 minutes.
- C. Elles sont souvent responsables de lésions cérébrales.
- D. L'électroencéphalogramme (EEG) permet de prédire la survenue ultérieure d'une épilepsie.
- E. Aucune des réponses n'est juste.

Réponse E : aucune

Les maladies suivantes peuvent se compliquer de pneumonie, sauf :

- A. Une bronchiolite
- B. La scarlatine
- C. Une varicelle chez un adolescent
- D. La rougeole
- E. La coqueluche

Réponse B : la scarlatine



Quelle est l'immunisation qui n'est plus généralement recommandée pour tous les enfants?

- A. Tétanos
- B. Diphtérie
- C. Rougeole
- D. Rubéole
- E. BCG

Réponse E : BCG



Quelle vaccination devrait en règle générale ne pas être appliquée dans la première année de vie en raison d'une possible interférence des anticorps IgG maternels encore présents?

La vaccination contre :

- A. La diphtérie
- B. L'hépatite B
- C. La rougeole-rubéole-oreillons
- D. La coqueluche
- E. L'*haemophilus influenzae* type B

Réponse C : la rougeole-rubéole-oreillons

Laquelle de ces assertions concernant la bronchiolite du nourrisson est fausse?

- A. Elle est le plus souvent d'origine virale
- B. Elle répond rapidement à un traitement antibiotique.
- C. Elle peut entraîner des apnées
- D. Elle se caractérise essentiellement par un syndrome obstructif
- E. Elle ne réagit que peu ou pas à l'administration de bronchodilatateurs

Réponse B

Le traitement du faux-croup inclut les mesures suivantes, sauf :

- A. L'humidification de l'air
- B. L'administration d'un calmant
- C. La surveillance de la fréquence respiratoire
- D. L'obligation d'une intubation nasotrachéale
- E. La surveillance de la saturation d'oxygène par une électrode transcutanée

Réponse D

Un garçon de 6 ans, scolarisé depuis 4 semaines, se présente avec une fatigabilité accrue et une pâleur. Il se plaint de douleurs nocturnes dans les jambes. A l'examen clinique, vous constatez un souffle systolique avec un pouls de 100/min, une hépatosplénomégalie (les deux à 4 cm du rebord costal) et de nombreux ganglions lymphatiques agrandis dans les aires cervicales et axillaires ainsi que des pétéchies sur le tronc et les jambes. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Infection par le virus d'Epstein-Barr
- B. Douleurs de croissance
- C. Purpura thrombocytopénique immun
- D. Mucopolysaccharidose
- E. Leucémie

Réponse E : Leucémie