

Examen fédéral de médecine Répétitoire 2019 - Pédiatrie

Médecin responsable :

Prof. Michaël Hofer

Professeur associé

Département femme-mère-enfant (DFME)

Le traitement médicamenteux des enfants souffrant d'asthme bronchique comprend les médicaments suivants, à l'exception de :

- A. Anti-leucotriènes
- B. Inhalation de sympathicomimétiques
- C. Corticostéroïdes topiques
- D. Antitussifs
- E. Corticostéroïdes systémiques

Réponse D : antitussifs

Quelle méthode de détoxification primaire est le plus souvent utilisée lorsqu'une intoxication par ingestion de baies toxiques a eu lieu dans l'heure précédente ?

- A. Mettre le doigt dans la gorge pour induire des vomissements
- B. Avaler du sirop d'Ipeca (émétique)
- C. Effectuer un lavage gastrique
- D. Effectuer une dialyse péritonéale
- E. Avaler du charbon actif

Réponse E : avaler du charbon actif

Dans laquelle des manifestations cutanées suivantes, faut-il faire un examen d'urine (sédiment, bandelette pour albumine et glucose) ?

- A. Dermatite atopique
- B. Erythème fessier
- C. Purpura rhumatoïde (Henoch-Schönlein)
- D. Mycose plantaire
- E. Poussée aiguë d'urticaire

Réponse C : purpura rhumatoïde

Les métastases de l'ostéosarcome se développent le plus fréquemment dans :

- A. Le foie
- B. Les poumons
- C. Le cerveau
- D. Le squelette
- E. La moelle osseuse

Réponse B : les poumons

Les premières incisives apparaissent normalement entre :

- A. 0 - 4 mois
- B. 5 - 9 mois
- C. 10 - 12 mois
- D. 13 - 16 mois
- E. 17 - 24 mois

Réponse B : 5 - 9 mois

L'enfant prononce ses premiers mots le plus fréquemment entre l'âge de :

- A. 6 et 9 mois
- B. 9 et 15 mois
- C. 15 et 21 mois
- D. 21 et 28 mois
- E. 28 et 36 mois

Réponse C : 15 et 21 mois

Les différentes formes d'arthrite juvénile idiopathique peuvent se présenter avec les symptômes suivants, sauf :

- A. La péricardite
- B. La polyarthrite
- C. La fièvre
- D. L'iridocyclite
- E. Une faiblesse musculaire proximale et symétrique

Réponse E : une faiblesse musculaire proximale et symétrique

La majorité des brûlures de l'enfant se passent :

- A. Au domicile, en absence d'un adulte
- B. Au domicile, avec un parent présent
- C. A l'extérieur du domicile
- D. Dans la salle de bains familiale
- E. Chez les enfants dont les 2 parents ont une activité professionnelle et qui sont confiés à une tierce personne

Réponse B : au domicile, avec un parent présent

La mucoviscidose est une maladie :

- A. Avec une bonne corrélation entre phénotype et génotype
- B. Avec une prédominance féminine
- C. Sujet d'un dépistage néonatal
- D. Liée à un dysfonctionnement des cils vibratiles
- E. Transmise par le chromosome X

Réponse C : sujet d'un dépistage néonatal

Qu'est-ce qui est exact à propos de la dermatite atopique ?

- A. Elle touche environ 10 % des enfants scolarisés en pays industrialisés
- B. Elle débute fréquemment avant l'âge de trois mois
- C. Une surinfection de ses lésions par des streptocoques est fréquente
- D. Une poussée aiguë ne se traite qu'en dernier recours par des dermocorticoïdes
- E. Le psoriasis de l'enfant représente une forme clinique de cette maladie

Réponse A

Un nourrisson de 2 mois présente une asymétrie des plis cutanés des cuisses. Quel examen faites-vous d'abord ?

- A. Une radiographie du bassin
- B. Une radiographie du rachis lombaire de face et de profil
- C. Une IRM du bassin
- D. Une scintigraphie osseuse
- E. Une mesure de la différence de longueur de jambes

Réponse E

Le purpura thrombocytopénique idiopathique de l'enfant :

- A. Est accompagné d'une diminution du nombre de mégacaryocytes dans la moelle osseuse
- B. Est caractérisé par la présence d'un grand nombre de globules rouges fragmentés sur le frottis sanguin périphérique
- C. Survient fréquemment à la suite d'une infection virale
- D. Est associé à une mortalité très élevée
- E. Est caractérisé par une diminution du dosage du complément sérique au début de l'affection

Réponse C

Quel énoncé au sujet de l'ataxie cérébelleuse aiguë de l'enfant est correct ?

- A. Elle est liée à des infections virales de l'enfant, en particulier la varicelle
- B. Elle touche plus les extrémités que l'axe du corps
- C. L'enfant reste capable de marcher seul
- D. La ponction lombaire est normale
- E. L'examen du fond d'oeil montre une stase papillaire

Réponse A

Chez un enfant de plus d'une année, quel énoncé concernant l'âge osseux est juste ?

- A. Pour déterminer l'âge osseux, il suffit de faire une radiographie du poignet pour compter les noyaux osseux des os carpiens
- B. L'âge osseux correspond à l'âge chronologique
- C. Pour la détermination de l'âge osseux, une radiographie de la main entière est nécessaire pour juger les noyaux d'ossification des os carpiens et de ceux des doigts
- D. La maturation osseuse est indépendante du sexe
- E. La détermination de l'âge osseux n'a de sens que chez l'adolescent

Réponse C

Dans les premières 24 heures après une brûlure du 2^e degré de 20 % de la surface corporelle, les affirmations suivantes sont exactes, sauf :

- A. La déperdition thermique est augmentée
- B. La diurèse a tendance à s'effondrer
- C. La perméabilité capillaire est accrue
- D. La pression veineuse centrale s'élève
- E. La douleur est très importante

Réponse D : la pression veineuse centrale s'élève

Quel facteur n'est pas prédisposant pour des otites moyennes à répétition chez un enfant ?

- A. L'atopie
- B. L'abus de nicotine des parents
- C. L'hypertrophie des végétations
- D. L'hypertrophie des amygdales
- E. Un trouble de la fonction ciliaire

Réponse D : l'hypertrophie des amygdales

Ces maladies peuvent être la cause d'un emphysème pulmonaire chez l'enfant, sauf laquelle ?

- A. L'asthme bronchique
- B. L'aspiration d'un corps étranger
- C. La coqueluche
- D. Le faux-croup (pseudocroup, hypolaryngite)
- E. La bronchiolite

Réponse D : le faux-croup

Quelle affirmation concernant la minéralisation osseuse dans l'enfance n'est pas juste ?

- A. La synthèse de l'os s'effectue principalement avant la puberté, le "peak bone mass" est atteint avant le commencement de la puberté.
- B. Les longues thérapies à la cortisone augmentent le risque d'une ostéopénie.
- C. La minéralisation osseuse peut être perturbée chez les enfants avec une maladie inflammatoire chronique à cause de l'augmentation de l'activité des cytokines.
- D. La malnutrition représente un facteur de risque pour le développement d'une ostéopénie.
- E. L'immobilisation représente un facteur de risque pour le développement d'une ostéopénie.

Réponse A

Les hormones suivantes entraînent une accélération de la maturation osseuse, sauf :

- A. La testostérone
- B. Le cortisol
- C. L'œstradiol
- D. Les anabolisants
- E. La thyroxine

Réponse B : le cortisol

Type K' - Les éléments suivants se retrouvent classiquement dans la thrombocytopénie immune primaire (anciennement purpura thrombocytopénique immun [PTI] aigu) de l'enfant :

- A. Une splénomégalie
- B. Des valeurs de thrombocytes très abaissées, sans modification des autres lignées
- C. Un bon état général de l'enfant
- D. Un purpura palpable

Réponse : - / + / + / -

Concernant les polypes nasaux du petit enfant, qu'elle affirmation, parmi les suivantes, est exacte ?

- A. Ils sont un signe d'hyperplasie adénoïdienne.
- B. Ils indiquent une allergie sous-jacente.
- C. Ils sont un signe-clé d'une mucoviscidose.
- D. Ils sont souvent associés à une déviation de la cloison nasale.
- E. Ils traduisent une malformation

Réponse C : signe-clé d'une mucoviscidose

Une toux irritative qui apparaît brutalement pendant la nuit et qui s'accompagne d'une détresse respiratoire et d'un sifflement purement expiratoire est typique :

- A. D'un faux-croup
- B. D'une fistule trachéo-oesophagienne
- C. D'un asthme bronchique
- D. D'une pneumonie à mycoplasme
- E. D'une aspiration d'un corps étranger

Réponse C : d'un asthme bronchique

Quel élément n'appartient pas aux critères majeurs de Jones du rhumatisme articulaire aigu :

- A. L'érythème marginé
- B. La cardite
- C. Le taux d'antistreptolysine augmenté
- D. La chorée de Sydenham
- E. La polyarthrite

Réponse C : le taux d'antistreptolysine augmenté

Différents types d'évolution d'une arthrite idiopathique juvénile sont possibles à l'exception :

- A. D'une atteinte mono-articulaire
- B. D'une sérosite (péricardite, pleurite) dans la forme systémique
- C. D'une fréquente atteinte rénale dans la forme systémique
- D. D'épisodes d'iridocyclite avec diminution importante de l'acuité visuelle
- E. D'une diminution de la mobilité des articulations atteintes

Réponse C

Jacques, 4 ans, connu pour un asthme sur allergie aux acariens. Allergie à la noix révélée par une réaction avec urticaire et dyspnée. Vous prescrivez un set d'urgence. Lequel de ces médicaments **doit** en faire partie ?

- A. Corticostéroïde inhalé
- B. Adrénaline injectable (auto-injecteur)
- C. Antileucotriène
- D. Antihistaminique anti-H2
- E. Le set d'urgence n'est pas indiqué car il induit une angoisse inutile chez l'enfant et ses parents

Réponse B : adrénaline injectable