

# Examen fédéral de médecine Répetitoire 2019 - Pédiatrie

**Médecin responsable:**

Dre Sandra Asner  
Médecin associée, PD&MER1  
Unité d'infectiologie pédiatrique



La surdité résulte souvent des affections suivantes, sauf :

- A. La rubéole congénitale
- B. La toxoplasmose congénitale
- C. La cytomégalie congénitale
- D. La syphilis congénitale
- E. La galactosémie

Réponse E : la galactosémie



Un enfant de 12 mois présente une méningite et une arthrite d'un genou. Quel est l'agent infectieux étiologique le plus probable?

- A. *Streptococcus pneumoniae*
- B. *Streptococcus pyogenes* (streptocoque bêta-hémolytique du groupe A)
- C. *Staphylococcus aureus*
- D. *Neisseria meningitidis*
- E. *Escherichia coli*

Réponse D : *Neisseria meningitidis*



La glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique à son début peut comporter tous les aspects suivants, sauf :

- A. Une diminution du complément sérique
- B. Une oligo-anurie
- C. Une hématurie macroscopique
- D. Des convulsions
- E. Une hyperparathyroïdie

Réponse E : une hyperparathyroïdie

Lequel des symptômes suivants ne parle pas en faveur d'une sinusite maxillaire aiguë?

- A. Une toux avant tout nocturne
- B. Des douleurs dentaires
- C. Des maux de gorge
- D. Un oedème périorbitaire
- E. Un écoulement pharyngien postérieur

Réponse C : des maux de gorge

Parmi les signes suivants, lequel est plus caractéristique d'une embryopathie rubéolique que d'une infection à cytomégalovirus congénitale?

- A. Purpura
- B. Cataracte
- C. Ictère
- D. Microcéphalie
- E. Surdit 

R ponse B : cataracte

Parmi les pathogènes bactériens chez le nouveau-né, lequel est le plus souvent responsable de méningite?

- A. Enterococcus spp
- B. Streptococcus pyogenes (GAS)
- C. Streptococcus agalactiae (GBS)
- D. Listeria monocytogenes
- E. Neisseria meningitidis

A. Réponse C : Streptococcus agalactiae (GBS)

Un bébé de 6 mois est hautement fébrile ( $40^{\circ}$ ) et irritable depuis quelques jours. La fontanelle est tendue. Le 3<sup>e</sup> jour, une ponction lombaire est pratiquée dont le résultat est normal. Le 4<sup>e</sup> jour apparaît sur le tronc un exanthème maculo-papulaire fin, rouge clair, simultanément la fièvre tombe. Quelle est la complication la plus fréquente au cours de la maladie que vous avez diagnostiquée?

- A. Une conjonctivite
- B. Une méningite
- C. Des convulsions fébriles
- D. Un syndrome hémolytique urémique
- E. Un anévrisme d'une artère coronaire

Réponse C : convulsions fébriles





La manifestation la plus spécifique de la toxoplasmose congénitale est :

- A. Microcéphalie
- B. Hépatomégalie
- C. Hydrocéphalie
- D. Chorioretinite
- E. Eruption cutanée

Réponse D : chorioretinite

A quel âge surviennent chez nous le plus fréquemment les infections à *Listeria monocytogenes* ?

- A. Chez le nouveau-né
- B. Entre 1 et 2 ans
- C. Entre la 2<sup>e</sup> et la 5<sup>e</sup> année
- D. Durant la période du jardin d'enfants
- E. Pendant la scolarité

Réponse A: chez le nouveau-né

La voie d'infection la plus fréquente d'une méningite chez l'enfant :

- A. hématogène
- B. Par continuité d'une otite moyenne aigue
- C. Suit le nerf olfactif
- D. Traverse la boîte crânienne (ostéomyélite, traumatisme)
- E. Ne correspond à aucune des voies susmentionnées

Réponse A : est hématogène



Un enfant qui revient d'un pays du Tiers-Monde présente une fièvre élevée et un état de prostration. Vous pensez avant tout à une fièvre typhoïde.

Quelle est la démarche la plus utile dans un tel cas?

- A. Une hémoculture
- B. Une recherche de l'agent pathogène dans les selles
- C. Une recherche de l'agent pathogène dans l'urine
- D. Un sérodiagnostic de Widal (sérologie)
- E. Aucune ci-dessus

Réponse A : une hémoculture

Combien de temps s'écoule-t-il entre le début d'une infection streptococcique et les manifestations d'une glomérulonéphrite aiguë?

- A. 24-48 heures
- B. 48-72 heures
- C. 1 semaine
- D. 1-3 semaines
- E. 2-3 mois

Réponse D : 1-3 semaines



En Suisse, le vaccin contre la rougeole est recommandé pour tous les enfants à partir de l'âge de :

- A. 6 mois
- B. 9 mois
- C. 12 mois
- D. 15 mois
- E. 18 mois

Réponse C : 12 mois

Chez l'enfant, l'infection urinaire est le plus souvent due à :

- A. *Proteus mirabilis*
- B. *E. coli*
- C. *Pseudomonas aeruginosa*
- D. *Klebsiella pneumoniae*
- E. *Enterococcus faecalis*

Réponse B : *E. coli*

Laquelle des affirmations suivantes concernant la syphilis congénitale est fausse?

- A. Le tréponème peut traverser le placenta et infecter le fœtus à n'importe quel moment de la gestation
- B. Le traitement de la mère pendant la gestation guérit aussi l'infection chez le fœtus
- C. Le tréponème cause souvent des malformations cardiaques
- D. Une hépato-splénomégalie peut s'observer chez des nouveau-nés atteints
- E. Une méningite est souvent présente

Réponse C



Les affirmations suivantes au sujet *d'un nouveau-né en CH d'une mère ayant une sérologie VIH positive MAIS AVIREMIQUE* sont justes, à l'exception de :

- A. L'enfant ne doit pas être allaité
- B. L'enfant doit dans les cas recevoir une prophylaxie post-expositionnelle (PEP) à la naissance pendant 4 semaines
- C. L'enfant a une probabilité de 85 % d'être infecté avec le virus humaine
- D. Les anticorps HIV peuvent être mis en évidence dans le sérum du nouveau-né
- E. L'enfant peut aller dans une garderie sans que les responsables soient informés du status VIH

Réponse C

Le diagnostic de coqueluche est basé sur les symptômes / constatations suivants, sauf :

- A. Lymphadénopathies généralisées
- B. Accès de toux émétisante
- C. Vomissements
- D. Peu ou pas de fièvre
- E. Leucocytose et lymphocytose

Réponse A : lymphadénopathies généralisées



Laquelle des affirmations suivantes concernant l'épiglottite est-elle incorrecte?

- A. Elle est généralement d'origine bactérienne
- B. Elle affecte rarement les enfants âgés de moins de 2ans
- C. Elle présente un risque de récurrence élevé
- D. Elle peut progresser très rapidement et entraîner le décès par asphyxie
- E. Les symptômes typiques sont le stridor et la dysphagie

Réponse C

Chez un enfant de 3 ans, l'agent pathogène le plus fréquent d'une méningite bactérienne est :

- A. Pneumocoque, *S. pneumoniae*
- B. streptocoque du groupe A, *S. pyogenes*
- C. streptocoque de groupe B, *S. agalactiae*
- D. *E. coli*
- E. Le staphylocoque

Réponse A : Pneumocoque, *S. pneumoniae*



Chez quel patient la morbidité et la mortalité de la varicelle sont-elles les plus élevées?

- A. Un nouveau-né dont la mère a eu la varicelle avant la grossesse
- B. Un nouveau-né dont la mère a eu la varicelle le jour de l'accouchement
- C. Un nourrisson de 6 mois, dont la soeur a la varicelle
- D. Un enfant de 5 - 9 ans
- E. Un enfant de 10 - 15 ans

Réponse B

## Que contient le vaccin BCG?

- A. Un surnageant de bactéries Tbc bovines atténuées par un passage dans un milieu de culture
- B. Un surnageant de bactéries tuberculeuses humaines atténuées par un passage par l'animal
- C. Un surnageant de bactéries tuberculeuses humaines tuées
- D. Un filtrat sans bactéries d'une culture de bactéries Tbc humaines
- E. Une toxine dénaturée à la formaline (toxoiide)

Réponse A



Une vraie pharyngite streptococcique est le plus souvent associée à :

- A. Une conjonctivite
- B. Une rhinite
- C. De la toux
- D. Un énanthème
- E. Une voix rauque

Réponse D : un énanthème

Quelle est la complication la plus fréquente de l'exanthème subit (fièvre de 3 jours)?

- A. Surinfection bactérienne cutanée
- B. Méningite bactérienne
- C. Néphrite
- D. Convulsions fébriles
- E. Hépatite

Réponse D : convulsion fébrile





Le plan suisse de vaccination de routine recommande à l'heure actuelle (2014) la vaccination entre 11 et 15 ans contre :

- A. La tuberculose et l'hépatite B
- B. L'hépatite B, la varicelle (si seroneg.), le HPV
- C. L'hépatite B
- D. Le tétanos et l'hépatite B
- E. La tuberculose et la varicelle (si seroneg.)

Réponse B : l'hépatite B, la varicelle (si seroneg.), le HPV

Quelle est la complication la plus fréquente de la première injection de vaccin Di-Te-Per à un nourrisson?

- A. Exanthème fugace
- B. Insomnie
- C. Fièvre
- D. Diarrhée
- E. Apnée

Réponse C : fièvre