

Examen fédéral de médecine Répétitoire 2019 - Pédiatrie

Médecin responsable:

Dr Sébastien Lebon

Médecin associé MER

Département femme-mère-enfant (DFME)

Lequel des symptômes et signes cliniques suivants n'est pas caractéristique de la polyradiculonévrite aiguë (syndrome de Guillain-Barré) ?

- A. Des paresthésies au niveau des jambes
- B. Une aréflexie
- C. Une parésie faciale bilatérale
- D. Une faiblesse asymétrique des membres inférieurs
- E. Une hypo- ou hypertension artérielle

Réponse D : faiblesse asymétrique des membres inf.

Le premier signe de puberté chez le garçon est :

- A. L'apparition de la pilosité axillaire
- B. L'apparition de la pilosité pubienne
- C. Le changement de voix
- D. La soudure des cartilages de conjugaison
- E. L'augmentation du volume des testicules

Réponse E : l'augmentation du volume des testicules

Qu'est-ce qui ne fait pas partie des signes d'un rachitisme carentiel diagnostiqué au stade initial :

- A. Chapelet costal
- B. Elargissement des métaphyses
- C. Hypotonie musculaire
- D. Appositions périostales
- E. Concentration normale du calcium plasmatique

Réponse D : appositions périostales

Un petit garçon de 14 mois arrive en Suisse avec sa famille comme réfugié d'un pays de l'Europe de l'Est. Il est nourri presque exclusivement au sein par sa mère épuisée par 5 grossesses rapprochées. L'enfant est à risque de présenter :

- A. Une anémie microcytaire marquée
- B. Un kwashiorkor
- C. Un marasme sévère
- D. Une xérophtalmie
- E. Un retard du développement psychomoteur

Réponse A : une anémie microcytaire marquée

Laquelle de ces anomalies n'appartient pas au syndrome de Turner ?

- A. Une petite taille
- B. Un oedème du dos de la main et du pied chez le nouveau-né
- C. Une malformation rénale
- D. Une hyperthyroïdie
- E. Une malformation cardiaque

Réponse D : une hyperthyroïdie

Laquelle des affirmations suivantes ne s'applique pas à une maladie transmise selon le mode héréditaire autosomique dominant ?

- A. La maladie se transmet par le biais d'un allèle dominant.
- B. Des personnes des deux sexes peuvent être atteintes par cette pathologie.
- C. Un homme atteint peut transmettre une telle maladie à ses fils.
- D. Lorsqu'un des parents est phénotypiquement malade, une partie de leurs enfants peut aussi théoriquement l'être.
- E. Une personne phénotypiquement indemne peut transmettre la maladie en question.

Réponse E

Les signes cliniques suivants sont caractéristiques d'un rachitisme, sauf :

- A. Le craniotabès
- B. Le chapelet costal
- C. Le genu varum
- D. L'élargissement des métaphyses
- E. La fracture

Réponse E : la fracture

Un trouble de la croissance avec un ralentissement net de la vitesse de croissance ne peut pas être dû à :

- A. Des facteurs psychosociaux
- B. Une maladie coeliaque
- C. Une insuffisance rénale chronique
- D. Un asthme chronique
- E. Une anomalie chromosomique XXY

Réponse E : Une anomalie chromosomique XXY

Lequel des facteurs biologiques psychosociaux et familiaux ne joue qu'un rôle insignifiant dans la pathogenèse de l'anorexie mentale ?

- A. Région urbanisée, industrialisée avec standard de vie élevé
- B. Couche sociale moyenne ou supérieure
- C. Famille dont la façon de communiquer est rigide tendant à éviter les conflits
- D. Perte inattendue d'un parent
- E. Processus de maturation physique et psychosocial au cours de la puberté

Réponse D : perte inattendue d'un parent

Par quelle mesure peut-on prévenir un coma diabétique qui est sur le point de se déclarer ?

- A. Augmenter les apports de liquide
- B. Arrêter l'alimentation
- C. Réinjecter de l'insuline à action rapide
- D. Augmenter la fréquence des autocontrôles par le patient
- E. Aucune des mesures mentionnées

Réponse C : réinjecter de l'insuline à action rapide

Une thrombopénie chez l'enfant entraîne le plus souvent :

- A. Une épistaxis
- B. Une hématurie
- C. Des pétéchie
- D. Un melaena
- E. Un saignement des gencive

Réponse C : des pétéchie

Dans l'hémophilie A, les paramètres de laboratoire suivants sont normaux, sauf :

- A. Le temps de thromboplastine partielle (aPTT)
- B. Le temps de saignement
- C. Le temps de prothrombine (Quick)
- D. Le nombre de thrombocytes
- E. L'agrégation plaquettaire

Réponse A : le temps de thromboplastine partielle

Au cours de quelle parasitose, le malade peut-il se réinfester immédiatement par des œufs expulsés ?

- A. *Ascaris lumbricoïdes*
- B. *Oxyuris vermicularis*
- C. *Taenia saginata*
- D. *Diphyllobothrium latum*
- E. *Ankylostoma duodenale*

Réponse B : *oxyuris vermicularis*

Quel laboratoire est typique d'enfant présentant un diabète insulino-dépendant inaugural ?

- A. pH 7.14, pCO₂, 20.9 mmHg, HCO₃⁻ 16.9 mmol/l Na⁺ 163 mmol/l, K⁺ 3.0 mmol/l, Cl⁻ 128 mmol/l
- B. B.pH 7.51, pCO₂, 46.5 mmHg, HCO₃⁻ 36.0 mmol/l Na⁺ 124 mmol/l, K⁺ 2.8 mmol/l, Cl⁻ 72 mmol/l
- C. C.pH 7.12, pCO₂, 40 mmHg, HCO₃⁻ 12.6 mmol/l Na⁺ 118 mmol/l, K⁺ 7.3 mmol/l, Cl⁻ 85 mmol/l
- D. D.pH 7.18, pCO₂, 58 mmHg, HCO₃⁻ 20 mmol/l Na⁺ 131 mmol/l, K⁺ 4.0 mmol/l, Cl⁻ 100 mmol/l
- E. E.pH 7.10, pCO₂, 23 mmHg, HCO₃⁻ 6.9 mmol/l Na⁺ 128 mmol/l, K⁺ 4.0 mmol/l, Cl⁻ 105 mmol/l

Réponse E

Un nourrisson âgé de 1 mois présente une hypertrophie clitoridienne.

Quel diagnostic n'entre pas en ligne de compte ?

- A. Syndrome adrénogénital
- B. Tumeur hypophysaire
- C. Tumeur de la mère produisant des androgènes
- D. Prise par la mère de substances anaboliques
- E. Tumeur cortico surrénale

Réponse B : tumeur hypophysaire

Laquelle des propositions suivantes, concernant une méningite bactérienne aiguë, est fausse ?

- A. L'*Haemophilus influenzae* de type b, autrefois agent pathogène le plus fréquent est devenu très rare depuis l'introduction de la vaccination contre ce germe dans le programme de vaccination de base.
- B. Les méningites à *Haemophilus influenzae* non typables (non encapsulés) sont devenues plus fréquentes depuis l'introduction de la vaccination contre *Haemophilus influenzae* de type b.
- C. Après la période néonatale, ce sont les pneumocoques et les méningocoques qui sont responsables de la majorité des cas de méningite bactérienne.
- D. Il existe des vaccins dirigés contre les pneumocoques et les méningocoques du groupe C.
- E. La complication résiduelle la plus fréquente d'une méningite à pneumocoques est la surdité de perception.

Réponse B

Les signes cliniques suivants font partie des critères majeurs du syndrome adéno-cutanéomuqueux (syndrome de Kawasaki), à l'exception de :

- A. Fièvre élevée de plus de 5 jours
- B. Grosse adénopathie cervicale
- C. Bronchite asthmatiforme
- D. Exanthème polymorphe
- E. Erythème et desquamation palmoplantaire

Réponse C : bronchite asthmatiforme

A propos de la prise en charge des anorexies mentales, quelle affirmation est fausse ?

- A. Il s'agit d'une maladie chronique potentiellement mortelle.
- B. Une prise en charge à la fois somatique et psychiatrique s'impose.
- C. On retrouve fréquemment une dysmorphophobie.
- D. Le traitement en milieu hospitalier est indispensable.
- E. Chez les jeunes anorexiques, la prise en charge de la famille est primordiale.

Réponse D

La migraine ne peut pas être accompagnée du symptôme suivant :

- A. Etat confusionnel
- B. Parésie motrice
- C. Céphalées persistantes pendant plusieurs semaines
- D. Troubles neurovégétatifs
- E. Céphalées diffuses

Réponse C

Quelle est la probabilité qu'un enfant sain, né de parents porteurs hétérozygotes du gène d'une maladie autosomale récessive à manifestations cliniques sévères (comme par exemple la fibrose kystique) soit également porteur hétérozygote de ce gène ?

- A. 25 %
- B. 33 %
- C. 50 %
- D. 66 %
- E. 100 %

Réponse D : 66 %

La fibrose cystique (mucoviscidose) est transmise selon le mode héréditaire suivant :

- A. Autosomal dominant
- B. Récessif lié au chromosome X
- C. Autosomal récessif
- D. Dominant lié au chromosome X
- E. Multifactoriel

Réponse C : autosomal récessif

Lequel des énoncés suivants est caractéristique du nanisme psychosocial ?

- A. Une sécrétion d'hormone de croissance dans les normes lors des épreuves de stimulation.
- B. Une reprise de la croissance lors de la séparation de l'enfant d'avec son milieu.
- C. Il se ramène à une carence dans l'apport nutritionnel.
- D. Il est déclenché par la séparation ou par l'abandon.
- E. Aucun des énoncés ci-dessus n'est juste.

Réponse B