

Parmi les syndromes suivants, lequel n'appartient pas aux Troubles Envahissants du Développement?

- A. Syndrome d'Asperger
- B. Syndrome de Rett
- C. Syndrome du X fragile
-  D. Syndrome de Down
- E. Syndrome désintégratif de l'enfance

(Holzer)

Quel est l'effet secondaire le plus fréquent des antipsychotiques de première génération chez l'enfant et l'adolescent?

- A. Prise de poids
- ☒ B. Symptômes extra-pyramidaux
- C. Troubles de l'accommodation
- D. Constipation
- E. Leucopénie

(Holzer)

Quel est l'effet secondaire le plus fréquent des antipsychotiques atypiques chez l'enfant et l'adolescent?

- ☒ A. Prise de poids
- B. Symptômes extra-pyramidaux
- C. Troubles de l'accommodation
- D. Constipation
- E. Leucopénie

(Holzer)

Lequel parmi ces psychotropes bénéficie du plus grand nombre d'essais randomisés en double aveugle pour valider son utilisation chez l'enfant?

- A. Halopéridol
- B. Lithium
- ☒ C. Méthylphénidate
- D. Fluoxétine
- E. Carbamazépine

(Holzer)

Lequel parmi ces psychotropes est théoriquement contre-indiqué dans le syndrome de Gilles de la Tourette?

- A. Halopéridol
- B. Lithium
- ☒ C. Méthylphénidate
- D. Fluoxétine
- E. Carbamazépine

(Holzer)

Lequel parmi ces psychotropes **n'est pas** un antipsychotique?

- A. Zuclopenthixol
- B. Olanzapine
-  C. Buspirone
- D. Lévipromazine
- E. Aripiprazole

(Holzer)

NB: Ces médicaments sont-ils tous enseignés en pédopsychiatrie??

Parmi les traitements suivants, lequel **ne fait pas** partie du traitement de l'énurésie?

- A. Antidépresseurs tricycliques
- B. Vasopressine
- C. Pipi-stop
- ☒ D. Dépakine
- E. Restriction hydrique

(Holzer)

Quel est le mécanisme le plus souvent en cause dans l'encoprésie?

- A. Atonie du sphincter anal
- B. Mégacolon idiopathique
- ☒ C. Suintements sur constipation
- D. Diarrhée
- E. Irritation colique

(Holzer)

Parmi les symptômes suivants, lequel **n'est** généralement **pas** observé dans l'anxiété de séparation?

- A. Angoisses de mort
- B. Refus de dormir à l'extérieur du domicile
- C. Insomnie
- D. Rituels d'endormissement rigides

 Hallucinations

(Holzer)

Parmi les symptômes suivants, lequel **n'est** généralement **pas** observé dans la dépression de l'enfant?

- ☒ A. Culpabilité
- B. Perturbations du sommeil
- C. Tristesse
- D. Agitation psychomotrice
- E. Faible estime de soi

(Holzer)

Parmi les comorbidités suivantes, laquelle est la plus fréquemment associée à l'anorexie mentale?

- A. Trouble obsessionnel-compulsif
- B. Phobie sociale
- ☒ C. Dépression
- D. TDAH
- E. Trouble panique

(Holzer)

Lequel des symptômes suivants **ne fait pas** partie des signes cardinaux de l'anorexie mentale?

- A. Aménorrhée
- ☒ B. Anosognosie
- C. Amaigrissement
- D. Anorexie
- E. Aucun des précédents

(Holzer)

Attention: E devrait être formulé « tous les précédents », puisqu'il est faux, et que la question est formulée en négatif.

Parmi les symptômes suivants, lequel **ne fait pas** partie des signes classiques précédant l'apparition d'une psychose à l'adolescence?

- A. Humeur dépressive
- B. Insomnie
- ☒ C. Hyperphagie
- D. Troubles de la concentration
- E. Isolement social

(Holzer)

Parmi les adolescents présentant un épisode dépressif majeur, quelle est la proportion de ceux qui ont des symptômes psychotiques associés?

A. 2 à 5 %

B. 5 à 10 %

☒ C. 20 à 40 %

D. Plus de 75 %

(Holzer)

Attention: manque une 5^e possibilité, fausse

Parmi les symptômes suivants de manie chez l'adolescent, lequel est **le moins** fréquent?

- A. Regain d'énergie
- B. Distractibilité
- C. Discours accéléré
- ☒ D. Hypersexualité

(Holzer)

Attention: il manque une 5^e possibilité, fausse

Quelle est la prévalence du syndrome de Gilles de la Tourette?

A. De 3 à 10 %

B. De 20 à 25 %

☒ De 3 à 10 pour mille

D. De 40 à 70 pour mille

(Holzer)

Attention: il manque une 5^e possibilité, fausse

Des symptômes modérés de confusion, de tremor évoluant vers des tremblements, des sueurs, une hyper-réflexie, une agitation, suivis de fièvre, de myoclonie et de diarrhée, sont évocateurs de:

- A. Syndrome de Stevens-Johnson (SJS)
- B. Syndrome malin des neuroleptiques (NMS)
-  C. Syndrome central sérotoninergique (CSS)
- D. Catatonie maligne

(Holzer)

Attention: il manque une 5^e possibilité, fausse

Face à une situation d'abus sexuel, quelle est la première obligation du clinicien?

- A. S'entretenir au plus vite avec les parents
- B. Adresser l'adolescent aux urgences pour une évaluation
- ☒ C. Signaler le cas aux services de protection des mineurs
- D. Planifier une série d'entretiens de suivi

(Holzer)

Attention, il manque une 5^e possibilité, fausse; il n'est pas précisé si l'abus vient de se produire ou s'il est ancien.

Quel est le facteur à haute valeur prédictive d'une issue favorable à la prise en charge d'un adolescent pour abus de substance?

- A. Age lors de la prise en charge
- ☒ B. Implication de la famille
- C. Thérapie de groupe
- D. Relation amoureuse, présence d'un(e) petit(e) ami(e)

(Holzer)

Attention: il manque une 5^e possibilité, fausse

Quelle est la proportion d'enfants qui voient leur énurésie disparaître suite à la prescription de desmopressine?

A. 10 %

B. 20 %

☒ C. 50 %

D. 70 %

E. 99%

(Holzer)

Selon les enquêtes épidémiologiques, quel est le pourcentage d'enfants préscolaires qui présentent des signes d'un trouble psychiatrique au sens du DSM-IV?

A. 1 %

B. 2 %

C. 5 %

 12 %

E. 27 %

(Holzer)

Parmi les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, lequel a reçu l'autorisation de Swissmedic pour le traitement de la dépression chez l'enfant et l'adolescent?

- A. Sertraline
- B. Citalopram
- C. Paroxétine
- ☒ Fluoxétine

(Holzer)

Attention: il manque une 5^e réponse, fausse

Une consommation de substances psychotropes associée à un trouble bipolaire chez un adolescent:

- ☒ A. péjore la sévérité et l'évolution des deux troubles
- B. conduit à un meilleur résultat pour la consommation de substances
- C. améliore le pronostic des deux pathologies
- D. représente la comorbidité la plus fréquemment diagnostiquée en pédopsychiatrie

(Holzer)

Attention: il manque une 5^e réponse, fausse. En outre, la formulation de la réponse B n'est pas très heureuse.

Vous évaluez un adolescent qui présente un trouble bipolaire actif et une conduite addictive, quelle attitude parmi les suivantes est recommandée?

- A. Débuter le traitement par un régulateur de l'humeur ou un antipsychotique dès que l'abstinence est observée
- ☒ B. Débuter le traitement par un régulateur de l'humeur ou un antipsychotique, indépendamment de l'obtention d'une abstinence
- C. Prescrire une prise en charge hospitalière pour les deux pathologies
- D. Prescrire des électrochocs

(Holzer)

Attention: il manque une 5^e réponse, fausse

Les stimulants peuvent conduire à:

- ☒ A. des retards dans le processus de croissance staturo-pondérale
- B. des retards dans le processus de croissance staturale
- C. des retards dans le processus de croissance pondérale
- D. aucun retard dans le processus de croissance

(Holzer)

Attention: il manque une 5^e réponse, fausse. En outre, l'énoncé est vague: les stimulants de quoi?

Parmi les causes suivantes de mortalité chez les jeunes, laquelle arrive en 3^e position en termes de fréquence?

- ☒ A. Suicides
- B. Accidents de la route
- C. Homicides
- D. Cancers

(Holzer)

Attention: il manque une 5^e réponse, fausse

Face à un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), le recours à la clonidine, guanfacine, ou au propranolol a pour but de:

A. réduire l'anxiété

☒ B. réduire l'hypersensibilité du système autonome et les phénomènes de répétition

C. améliorer l'humeur

D. réduire les manifestations pseudo-hallucinatoires de type auditif

(Holzer)

Attention: il manque une 5^e réponse, fausse

La majorité des adolescents s'efforce d'acquérir une forme d'autonomie appropriée à leur âge tout en gérant leur maladie psychique. Cela conduit souvent à:

- A. une meilleure introspection
- ☒ B. une non adhésion au traitement
- C. une collusion familiale
- D. des fugues

(Holzer)

Attention: il manque une 5^e réponse, fausse

Quel est le trouble qui accompagne le plus souvent le diagnostic de schizophrénie de l'enfant?

- A. Trouble anxieux généralisé
- B. Trouble obsessionnel compulsif
- ☒ C. Trouble dépressif
- D. THADA
- E. Aucun des précédents

(Holzer)

Quelle est la meilleure méthode pour évaluer les modifications du poids corporel lors de la surveillance d'un traitement antipsychotique chez l'enfant?

- A. Mesure du tour de taille
- B. Mesure du poids (sans les chaussures)
- ☒ BMI z-score
- D. Valeur absolue du BMI

(Holzer)

Attention, il manque une 5^e réponse, fausse

Tous les symptômes suivants sont des effets secondaires des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, **sauf**:

- A. nausées et vomissements
 - B. akathisie
 - C. manque d'énergie
 - D. idéation suicidaire
-  anhédonie

(Holzer)

Quels sont les effets directs sur la vessie de l'imipramine utilisée dans l'énurésie?

- A. Effets anticholinergiques
 - B. Effets sérotoninergiques
 - C. Effets adrénergiques
 - D. Effets sérotoninergiques et adrénergiques
-  Effets anticholinergiques et adrénergiques

(Holzer)

Parmi les éléments suivants, lequel est informatif sur le pronostic et l'évolution du trouble, et qui délimite les traitements validés empiriquement pour un trouble spécifique?

- A. L'historique des traitements antérieurs
- B. La comorbidité
- C. L'évaluation du fonctionnement familial
-  D. Le diagnostic
- E. Le niveau scolaire

(Holzer)

NB: la formulation de la question n'est pas très spécifique pour la pédopsychiatrie...

Les manifestations cliniques les plus courantes de l'insomnie chez l'enfant comprennent tous les éléments suivants, **sauf**:

- A. refus d'aller se coucher
- B. retard à l'endormissement
- ☒ C. réveil précoce au petit matin
- D. veille nocturne prolongée
- E. aucun des précédents

(Holzer)

Attention: la réponse E est aussi correcte (puisque'elle est fausse, si je puis dire...)

Parmi les éléments suivants, lequel ou lesquels est/sont fortement prédictif(s) du devenir d'un enfant présentant un trouble du spectre autistique?

- A. Aptitudes langagières
- B. Épilepsie
- C. QI
- D. Aptitudes adaptatives
- ☒ Aptitudes adaptatives et langagières

(Holzer)

Quels sont les deux troubles les plus fréquemment associés au syndrome de Gilles de la Tourette?

- ☒ A. THADA et TOC
- B. Episode dépressif majeur et trouble oppositionnel avec provocation
- C. THADA et anxiété de séparation
- D. Trouble anxieux non spécifié et automutilations

(Holzer)

Attention, il manque une 5^e réponse, fausse

Quel profil de patient est le plus susceptible de répondre favorablement au traitement médicamenteux des symptômes obsessionnels compulsifs (TOC)?

- ☒ TOC seul
- B. TOC et THADA
- C. Toc et tic
- D. TOC et trouble oppositionnel avec provocation

(Holzer)

Attention, il manque une 5^e réponse, fausse

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

- ☒ On retrouve très souvent des antécédents de pertes ou de séparations chez des enfants ou adolescents déprimés
- B. SPITZ a décrit la dépression anaclitique chez des nourrissons de 12-14 mois séparés de leur mère
- C. La position dépressive décrite par Mélanie KLEIN située aux environs du second semestre puis de la deuxième année de la vie correspond au stade de perception de l'objet anal
- D. BOWLBY a décrit les réactions des bébés séparés de leur mère en 3 phases successives : a)une phase de détachement; b)une phase de protestation; c)une phase de désespoir
- E. La dépression franche à l'adolescence est plus fréquente que chez l'adulte

(Halfon)

Laquelle des propositions suivantes concernant la dépression chez l'enfant est correcte?

- A. La dépression masquée inclut des troubles pouvant être assimilés à un désordre dépressif avec modification dépressive de l'humeur
- B. La dépression est plus fréquente chez les pré-pubères que chez les adolescents
-  C. Chez l'enfant, l'épisode dépressif majeur est souvent associé à d'autres troubles, notamment les troubles anxieux de l'enfance
- D. Les échelles d'évaluation de la dépression de l'enfant et de l'adolescent permettent de faire un diagnostic de dépression
- E. Chez les pré-pubères, la dépression est deux fois plus fréquente chez les filles que chez les garçons

(Halfon)

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

- A. Les symptômes du trouble hyperactivité avec déficit d'attention (TDAH) doivent avoir des répercussions dans au moins un contexte (école, travail, maison)
 - B. Le sous-groupe des inattentifs est le sous-groupe clinique le plus fréquent du TDAH
 - C. Le TDAH est un syndrome avec peu de comorbidités associées
-  Le TDAH s'aggrave habituellement dans les situations mal cadrées

(Halfon)

Attention, il manque une 5^e réponse, fausse

Les sujets souffrant d'un Trouble hyperactivité avec déficit d'attention (TDAH) :

- A. n'ont pas de peine à se concentrer en classe ou lors d'autres activités
- B. n'ont pas des oublis fréquents dans la vie quotidienne
-  perdent souvent les objets nécessaires à leur travail ou à d'autres activités
- D. ne sont pas très intelligents

(Halfon)

Attention: il manque une 5^e réponse, fausse

Laquelle des propositions suivantes concernant le Trouble d'hyperactivité avec déficit d'attention (TDAH) est correcte ?

- A. Le TDAH est un trouble homogène aux degrés variables d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité
- B. Le TDAH est rarement associé avec des troubles comme le trouble oppositionnel avec provocation, l'agressivité, les tics, les troubles développementaux de la coordination, l'anxiété, la dépression et la dyslexie.
-  C. Le TDAH requiert une investigation globale de l'enfant par des spécialistes de diverses disciplines pour évaluer des profils de comportement, ainsi que des fonctions cognitive, émotionnelle et sociale.
- D. Des thérapies supplémentaires pour le traitement des problèmes d'apprentissage, d'autres troubles psychiatriques éventuels et des problèmes neuropsychologiques sont inutiles.

(Halfon)

Attention: il manque une 5^e réponse, fausse

Parmi ces pistes d'investigation au cours de l'examen psychiatrique de l'adolescent, laquelle vous permet d'évaluer au mieux le processus d'adolescence ?

- A. Les consommations de substances psycho-actives, d'alcool, de tabac, les troubles du comportement et les conduites à risque
-  B. Le vécu de la puberté, le changement des relations avec les parents et avec les pairs, et l'attitude du jeune face à son avenir
- C. Les perturbations du sommeil, des conduites alimentaires, la fatigue, les problèmes de santé physique
- D. La dépression, la suicidalité, le stress, l'anxiété
- E. Les relations amicales, les expériences nouvelles, la vie amoureuse et la sexualité

(Halfon)

A propos de l'importance du contexte familial et social en psychiatrie, laquelle des propositions suivantes est correcte ?

-  Loin de constituer un obstacle à l'autonomie, l'attachement de l'enfant à ses parents et à ses proches en est au contraire la condition
- B. La vulnérabilité, c'est la facilité de résister aux contraintes de l'environnement
- C. La résilience, ce n'est pas la possibilité de se développer quand même, malgré des conditions difficiles, voire extrêmes
- D. La compétence, ce n'est pas la capacité active d'utiliser ses aptitudes pour agir et tenter d'agir sur son environnement

(Halfon)

Attention: il manque une 5^e réponse, fausse. Et je ne suis pas convaincu par la formulation des propositions C et D...

Lorsqu'un diagnostic de dépression du bébé est posé, que faut-il faire dans un premier temps ?

- A. Hospitaliser le bébé en pédiatrie
- B. Hospitaliser la mère en psychiatrie
- ☒ C. Evaluer la qualité de la relation parent-enfant
- D. Evaluer l'état psychique des parents
- E. Médiquer l'enfant

(liaison)

Le concept de transparence psychique pendant la période de la grossesse c'est :

- A. Une période sensible à la réactivation de la crise œdipienne.
- B. Une période où la femme est davantage centrée sur sa propre histoire
- C. Une période propice à la psychothérapie
- ☒ D. Toutes ces réponses
- E. Aucune de ces réponses

(liaison)

Attention: ça ne peut pas être D, telle que formulée, puisque E est faux...

La préoccupation maternelle primaire selon D. Winnicott c'est :

- A. une incapacité chez la mère à percevoir les signaux du bébé
- ☒ B. une hypersensibilité au besoin du bébé, incitant la mère à s'identifier et à distinguer les signaux du bébé
- C. un état fusionnel entre la mère et son bébé favorisant un accordage positif au sein de la dyade dans les trois premières années de vie de l'enfant
- D. un état qui provient de la réémergence des conflits infantiles de la mère
- E. aucune de ces réponses

(liaison)

Laquelle de ces affirmations est juste concernant la psychose du post-partum?

- A. La psychose du post-partum se résout spontanément
 - B. Elle survient typiquement 3 mois après l'accouchement
 - C. Elle touche une femme sur 100
 - D. Elle ne concerne pas l'enfant
-  Elle se caractérise par des troubles fréquents de l'humeur

(liaison)

Lequel de ces énoncés caractérise une névrose?

- A. Avoir une conscience morbide
- ☒ B. Avoir un trouble de la perception de la réalité externe
- C. Etre une affection psycho-somatique
- D. Avoir une altération de la perception de la réalité
- E. Avoir des hallucinations

(liaison)

A mon avis, pas très spécifique de la pédopsychiatrie, et pas très heureux (je connais des schizophrènes qui ont une conscience morbide...)

Lequel de ces énoncés **ne** caractérise **pas** la névrose hystérique?

- A. Le symptôme est parfois retrouvé dans l'entourage
- B. Le patient montre une belle indifférence face à son symptôme
- ☒ C. Il existe un substrat somatique
- D. Le tableau complet n'existe pas chez l'enfant
- E. Il y a exagération ou inhibition d'une fonction du corps

(liaison)

Lequel des comportements ci-dessous **ne** pousse **pas** à suspecter un autisme chez le jeune enfant ?

- A. Alignement de jouets
- ☒ B. Angoisses de séparation
- C. Ne répond pas à son prénom
- D. Echolalie
- E. Ne joue pas avec les autres enfants

(liaison)

Lorsqu'un enfant est malade, de quelle attitude doit-on s'inquiéter ?

- A. Réapparition de comportements d'un enfant plus jeune
- ☒ B. Retrait affectif et relationnel important
- C. Demandes affectives importantes
- D. Manque de désir pour jouer
- E. Envie de lire

(liaison)