



Bactéries gram positives



Bactéries gram négatives

Bacilli

Enterobacteriaceae

E. Coli
Klebsiella spp.
Enterobacter spp.
Salmonella spp.
Shigella spp.
Serratia spp.

Various

Haemophilus influenzae
Bordetella pertussis
Brucella spp.
Pasturella spp.
Vibrio spp.
Campylobacter spp.

Non-fermenters

Pseudomonas spp.
Burholderia spp.
Acinetobacter spp.
Stenotrophomonas spp.

Anaerobes

Bacteroides spp.
Prevotella spp.
Porphyromonas spp.
Fusobacterium spp.

Cocci

Neisseria gonorrhea
Neisseria meningitidis
Moraxella catarrhalis

Spirochete

Treponema pallidum
Borrelia burgdorferi
Leptospira spp.



Pleomorphic

Chlamydia spp.
Rickettsia spp.

Classification bactérienne

Encapsule

← Asplénique

Thick-wal- led cells Coloration au bleu de méthylène pour un examen direct	ex- trac.	Gram positif - coloration en vio- let par le complex gentiane et lugol - épais PGN (10 à 80nm) - acide téchoïque ou lipotechoïque - capsule ? - pili ou flagelles ? - sensible à un ttt. à la pénicilline ou vancomycine - bacitracine (inhi- biteur des gram +)	Cocci			Streptococcus (en chaîne) -> aérotolérants , énergie par fermentation uniquement, possèdent une SOD mais pas de catalase, sen- sible à la bacitracine (comme bact. oropharyngienne) - Pyogène (groupe A) -> angine, infection cutanée, Béta-hémolyse sur gélose au sang, agglutination au latex (prot. M), antigène anti-groupe A - Agalactiae (groupe B) -> Sepsis et Méningite néonatale , antigène anti-groupe B (B-hémo.) - Pneumoniae (pneumocoque, m. communautaire) , présente une capsule, s'ar- range en diplocoque (pas en chaînette), gélose au sang ou dans les urines (alpha- hémolyse et sensibilité à l'optochine) - Equi, Dysgalactiae : groupe C - Milleri -> odeur de beurre 
						Staphylococcus (en amas) -> adhésine, leucocidine, protéase - Aureus -> facultative, plus virulente que l'epidermidis grâce à coagulase et prot. A, infection suppurative ou toxigénique (entérotoxine, toxine exfoliative), pneumonie nosocomiale, 30% en sont porteurs - Epidermidis - sur la peau chez tout le monde 
						Bacillus - anthrax - subtilis (premier Gram + séquencé complètement) Clostridium (généralement dans le tractus digestif) - Difficile -> donne la colite post-antibiotique - Botuli - Tetani
						Corynebacterium diphtheriae toxine de la diphthérie obtenue par un bactériophage lysogénique Listeria Actinomyces (Actinobacterium xanthus) Nocardia
						Lactobacille -> production de bactéricine et acide lactique (fermentation) dans le vagin contre des colo- nisations
						Cocci -> forme ronde Rods - bacille -> forme de batonnet Facultative - -> forme droite -> ATP par respiration et fermenta- tion -> présence de catalase et SOD
						Neisseria -> NedA (adhésine) - Gonorrhea (MST) - Meningitis (méningocoque) Haemophilus - Meningitis - Influenza -> possède une capsule, pneumonie communautaire , gélose chocolat bacitracine (gène fasti- dieu, satellitisme par facteurs de croissance), premier génome complètement séquencé Legionella -> peut se transporter dans l'eau via amibe (humidificateur, climatiseur), pneumonie nosoco- miale atypique et pas lobaire (gélose au charbon , ou détection dans les urines) Brucella Pasteurella Yersinia -> YedA (adhésine) Francisella - Enterobacter (LAC+) - Escherichia Coli (LAC+) -> flore commensale -> ETEC (entérototoxigènes : turista), EIEC (invasives), EHEC (hémorragiques : vérotoxine ou shiga toxine, épidémie en 2011 avec forte résistance antibiotique), EPEC (pathogènes), cystite (+ si présence d'adhé- sine : fimbriae) - chez ¼ des femmes - Souche K12 - Pneumonie nosocomiale -> Enter. Cloacae, Morganella Morganii, Citrobacter freundii, E. Coli Klebsiella (Pneumoniae nosocomiale) -> présente une capsule (forme un halo clair en coloration Gram) Salmonella (LAC-) - Typhimurium -> fièvre typhoïde (+virulente par perte de gène) - Enteritidis -> diarrée Shigella -> shiga toxine -> par rapport à E.Coli : + virulente, pas de mobilité, pas de métabolisme de lactose, maltose et xylose, perte du gène CadA (cadavérine : rend moins toxique) et ompT (bloque pINV : syst. de sécrétion) Proteus Campylobacter -> microaérophile (marche mieux à basse oxygénation) Vibrio Pseudomonas aeruginosa (pneumonie nosocomiale) -> gélose McConkey (LAC-) Bordetella Pertusis -> agent de la coqueluche Bacteroides fragilis
						Acid fast -> Ziehl- Neelsen Stain -> PCR Intracellulaire -> Culture cellulaire (ne poussent pas sur gélose) -> PCR très adaptée, ou lorsque les bact. ne sont plus viables suite à un ttt antibio- tique
						Thin-walled cells - eg. Spirochetes -> examen sur fond noir Wall-less cells - ø de PGN Autres
						Treponema pallidum Borrelia burgdorferi Leptospira Syphilis Mycoplasma -> Pas de PGN donc résistant à la pénicilline et dérivés (2 ^{ème} séquencé : Genitalium) - Pneumoniae (m. communautaire) -> transmission inter-personnelle et pneumonie atypique Cyanobactéries -> a donné les chloroplastes Helicobacter -> résistance à faible PH par sécrétion de NH3, diminue apport en fer Estrella Lausensis -> forme d'étoile Waddlia -> fausse couches Maracoccus catenulatus

(HACE K)

