

| CLASSE               | DCI           | Spécialité  | Buv | Activation | Sédation | ↑Poids | ↓Libido | ↓TA | -ACh | ↑QTc | ▲▲           |
|----------------------|---------------|-------------|-----|------------|----------|--------|---------|-----|------|------|--------------|
| <b>DIND + MT</b>     | Agomélatine   | VALDOXAN®   | -   | +          | +        | +/-    | +/-     | +/- | +/-  | +/-  | Foie         |
| <b>SRS</b>           | Tianeptine    | STABLON®    | -   | +          | +        | +/-    | +/-     | +/- | +    | +/-  | Stupéfiant   |
| <b>IRND</b>          | Bupropion     | ZYBAN®      | -   | +++        | +/-      | +/-    | +/-     | +/- | +/-  | +/-  | AMM          |
| <b>IRSN</b>          | Duloxétine    | CYMBALTA®   | -   | ++         | +        | +/-    | +       | +/- | +    | +/-  | Douleur      |
|                      | Venlafaxine   | EFFEXOR®    | -   | +          | +        | +      | +       | +/- | +    | ++   | HTA          |
|                      | Milnacipran   | IXEL®       | -   | +++        | ++       | +/-    | +       | +/- | +    | +/-  | Douleur      |
| <b>ISRS</b>          | Vortioxétine  | BRINTELLIX® | -   | +          | +/-      | +      | ++      | +/- | +/-  | +/-  | Multimodal   |
|                      | Escitalopram  | SEROPLEX®   | +   | +          | +/-      | +      | ++      | +/- | +/-  | +++  | ISRS         |
|                      | Sertraline    | ZOLOFT®     | -   | ++         | +/-      | +      | +++     | +   | +/-  | +    | Délire       |
|                      | Citalopram    | SEROPRAM®   | +   | +          | +        | +      | ++      | +/- | +/-  | +++  | QTc          |
|                      | Paroxétine    | DEROXAT®    | +   | +          | ++       | ++     | +++     | +/- | +    | +    | Sevrage      |
|                      | Fluoxétine    | PROZAC®     | +   | +++        | +/-      | +/-    | ++      | +/- | +/-  | +    | Boulimie     |
|                      | Fluvoxamine   | FLOXYFRAL®  | -   | +          | ++       | +      | ++      | +/- | +/-  | +/-  | Interactions |
| <b>TÉTACYCLIQUES</b> | Mirtazapine   | NORSET®     | +   | ++         | +++      | +++    | +/-     | +/- | +/-  | ++   | Hypnotique   |
|                      | Miansérine    | ATHYMIL®    | -   | +          | +++      | +++    | +/-     | ++  | +/-  | +/-  | Hypnotique   |
|                      | Maprotiline   | LUDIOMIL®   | -   | ++         | +++      | +++    | +/-     | +   | +    | +    | Douleur      |
|                      | Amoxapine     | DEFANYL®    | -   | +          | ++       | ++     | +       | ++  | +    | +/-  | Neurolepsie  |
| <b>TRICYCLIQUES</b>  | Dosulépine    | PROTHIADEN® | -   | +          | +++      | +++    | +       | +/- | ++   | +    | Douleur      |
|                      | Doxépine      | QUITAXON®   | -   | +          | +++      | +++    | +       | ++  | +    | +    | Hypnotique   |
|                      | Trimipramine  | SURMONTIL®  | +   | +          | +++      | +++    | +       | ++  | +    | ++   | Hypnotique   |
|                      | Clomipramine  | ANAFRANIL®  | -   | ++         | ++       | ++     | +++     | +++ | ++   | ++   | Puissant     |
|                      | Amitriptyline | LAROXYL®    | +   | ++         | +++      | +++    | ++      | ++  | +++  | +    | Douleur      |
|                      | Imipramine    | TOFRANIL®   | -   | ++         | ++       | ++     | ++      | +   | +    | ++   | Équilibré    |
| <b>IMAO</b>          | Moclobémide   | MOCLAMINE®  | -   | +++        | +        | +/-    | +/-     | +/- | +    | +/-  | Puissant     |
|                      | Iproniazide   | MARSILID®   | -   | +++        | +        | +/-    | +/-     | +/- | +    | +/-  | Interactions |

# 10 EFFETS SECONDAIRES

fréquemment rencontrés sous  
**ANTIDÉPRESSEURS**

**SEROPRAM®**  
Citalopram

**SEROPLEX®**  
Escitalopram

**PROZAC®**  
Fluoxétine

**FLOXYFRAL®**  
Fluvoxamine

**DEROXAT®**  
Paroxétine

**ZOLOFT®**  
Sertraline

**EFFEXOR®**  
Venlafaxine

**CYMBALTA®**  
Duloxétine

**IXEL®**  
Milnacipran

**ATHYMIL®**  
Miansérine

**NORSET®**  
Mirtazapine

**STABLON®**  
Tianeptine

**ZYBAN®**  
Bupropion

**ETC.**

## Nausées, vomissements

Effet généralement transitoire.

Éviter la prise du médicament à jeun.

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

## Maux de tête

Effet généralement transitoire.

Négocier une diminution de dose, un changement de médicament ou une prescription d'antalgique mineur (ex. paracétamol).

## Diarrhée, transpiration

Boire suffisamment d'eau.

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

## Constipation, bouche sèche

Marcher, faire de l'exercice, manger beaucoup de fruits crus et de légumes, boire beaucoup d'eau notamment le matin à jeun.

Négocier une diminution de dose, un changement de médicament ou la prescription d'un médicament laxatif.

## Fatigue, somnolence

Éviter la conduite dans la mesure du possible.

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

## Nervosité, insomnie

Éviter la prise du médicament le soir.

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

## Baisse de motivation, émoussement émotionnel

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

## Mouvements anormaux, sensation d'inconfort

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.


## Baisse de libido

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

## Prise de poids

Marcher, faire de l'exercice, manger beaucoup de fruits crus et de légumes, boire beaucoup d'eau notamment le matin à jeun.

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

|                                                                                                                                                                                                   | SUBSTITUTION DIRECTE                                                                                 | SUBSTITUTION CROISÉE                                                                                                                                                                                                | SUBSTITUTION RETARDÉE                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | immédiat                                                                                             | 1-4 sem                                                                                                                                                                                                             | 1-5 sem                                                                                                                                  |
| COMMENT CHANGER D'ANTIDÉPRESSEUR                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                  |                                                       |
| Interactions                                                                                                                                                                                      | +++                                                                                                  | ++                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                        |
| Symptômes de sevrage                                                                                                                                                                              | +                                                                                                    | ++                                                                                                                                                                                                                  | +++                                                                                                                                      |
| Indication                                                                                                                                                                                        | À réserver aux médicaments d'une même classe, et au changement IRSR → IRSN                           | Convient à la plupart des situations mais pas lorsqu'un IMAO est impliqué                                                                                                                                           | À réserver aux situations impliquant les IMAO ou à risque d'interaction dangereuse                                                       |
| SYMPTÔMES DE SEVRAGE                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
| Sérotoninergiques (5-HT)                                                                                                                                                                          | Adrénnergiques (NA)                                                                                  | Cholinergiques (ACh)                                                                                                                                                                                                | Histaminergiques (H)                                                                                                                     |
| Syndrome grippal : vertiges, maux de tête, nausées, fatigue, faiblesse musculaire<br>Insomnie<br>Anxiété<br>Engourdissements et picotements<br>Sensations de décharge électrique                  | Tachycardie<br>Hypertension<br>Anxiété<br>Agitation<br>Transpiration<br>Tremblements<br>Maux de tête | Nausées<br>Vomissements<br>Transpiration<br>Maux de tête<br>Crampes abdominales<br>Spasmes musculaires<br>Envie d'uriner                                                                                            | Agitation<br>Insomnie<br>Maux de tête<br>Transpiration<br>Nausées                                                                        |
| CLASSES D'ANTIDÉPRESSEURS                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
| ISRS (5-HT)                                                                                                                                                                                       | IRSN (5-HT + NA)                                                                                     | Tricycliques (5-HT + NA + ACh + H)                                                                                                                                                                                  | Autres classes                                                                                                                           |
| Citalopram : SEROPRAM® (+H)<br>Escitalopram : SEROPLEX®<br>Fluoxétine : PROZAC®<br>Fluvoxamine : FLOXYFRAL®<br>Paroxétine : DEROXAT® (+ACh)<br>Sertraline : ZOLOFT®<br>Vortioxétine : BRINTELLIX® | Venlafaxine : EFFEXOR®<br>Duloxétine : CYMBALTA®<br>Milnacipran : IXEL®                              | Amitriptyline : LAROXYL®<br>Amoxapine : DEFANYL®<br>Clomipramine : ANAFRANIL®<br>Dosulépine : PROTHIADEN®<br>Doxépine : QUITAXON®<br>Imipramine : TOFRANIL®<br>Maprotiline : LUDIOMIL®<br>Trimipramine : SURMONTIL® | Mirtazapine : NORSET® (+H)<br>Miansérine : ATHYMIL® (+H)<br>Tianeptine : STABLON®<br>Agomélatine : VALDOXAN®<br>Bupropion : ZYBAN® (+NA) |
|                                                                                                                                                                                                   | IMAO<br>Moclobémide : MOCLAMINE®<br>Iproniazide : MARSILID®                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |

# ANTIDÉPRESSEURS

## SYNDROME D'ARRÊT, DE DISCONTINUATION, DE SEVRAGE

Les symptômes ci-dessous peuvent apparaître lors de l'interruption ou de la diminution trop rapide d'un traitement antidépresseur. Bien que la plupart des molécules soient concernées, celles qui ont une demi-vie courte semblent poser le plus de problèmes (ex. paroxétine et venlafaxine). Il est généralement conseillé de reprendre le médicament ou de réaugmenter la dose, puis de la diminuer très progressivement, par paliers, voire de changer de médicament au profit d'une molécule à demi-vie plus longue et/ou en solution buvable (ex. fluoxétine) qui sera plus facile à interrompre de façon similaire.

