


# LA DÉPRESSION


## SYMPTÔMES ET SOUS-TYPES

Les troubles dépressifs sont caractérisés par une humeur dépressive (se sentir triste, vide ou sans espoir) et/ou une perte de plaisir accompagnée d'autres symptômes cognitifs, comportementaux ou neurovégétatifs qui affectent de manière significative la capacité de fonctionnement de la personne concernée. Parmi les premières causes d'incapacité dans le monde, la dépression touche environ 5% de la population adulte avec une prédominance chez la femme. Aigue ou chronique, de sévérité variable, elle peut conduire jusqu'au suicide, récidive fréquemment et peut parfois révéler un trouble bipolaire.

### 2 SYMPTÔMES PRIMAIRES



### 7 SYMPTÔMES SECONDAIRES



### 2 TYPES DE DÉPRESSION

Suis-je dans mon état habituel ?

#### NON = DÉPRESSION AIGUE

Rupture avec le fonctionnement antérieur

#### TR Trouble Dépressif Caractérisé

(= épisode dépressif majeur)

Au moins 5 SYMPTÔMES

parmi lesquels HUMEUR DÉPRESSIVE et/ou ANHÉDONIE

Quasiment TOUTE LA JOURNÉE et presque TOUS LES JOURS

Pendant au moins 2 SEMAINES

#### OUI = DÉPRESSION CHRONIQUE

Pas de rupture avec le fonctionnement antérieur

#### TR Trouble Dépressif Persistant

(= dysthymie)

Au moins 3 SYMPTÔMES

parmi lesquels HUMEUR DÉPRESSIVE

Quasiment TOUTE LA JOURNÉE et plus d'UN JOUR SUR DEUX

Pendant au moins 2 ANS

### CARACTÉRISTIQUES

Suis-je encore sensible aux choses agréables ?

NON = anesthésie affective

OUI = les événements positifs améliorent mon humeur

#### MÉLANCOLIQUES

Je me réveille très tôt  
Je me sens plus mal le matin  
Je suis très ralenti-e ou très agité-e  
Je perds l'appétit et du poids  
Je me sens coupable et désespéré-e

#### ATYPIQUES

Je prends de l'appétit et du poids  
Je dors beaucoup plus  
J'ai des sensations de lourdeur  
Je suis très sensible au rejet

#### MIXTES

J'ai au moins 3 des symptômes (hypo)maniaques suivants : humeur élevée, augmentation de l'estime de soi, désir de parler constamment, fuite des idées, augmentation de l'énergie, activités à risques, réduction du besoin de sommeil.

#### CATATONIQUES

J'ai au moins trois des symptômes suivants : stupeur, catalepsie, flexibilité cireuse, mutisme, négativisme, prise de posture, maniérisme, agitation, stéréotypies, expression grimaçante, écholalie, échopraxie.

#### ANXIEUSES

Je me sens énervé-e, tendu-e, j'ai du mal à me concentrer et/ou je m'agite à cause de mes ruminations, j'ai peur qu'il arrive une chose d'horrible, je crains de perdre le contrôle.



#### PSYCHOTIQUES

J'ai des hallucinations et/ou des idées délirantes (congruentes si en rapport avec culpabilité, maladie, mort, nihilisme, punition méritée ou inadéquation personnelle).

# LA DÉPRESSION

## SCHÉMAS DÉPRESSOGÈNES

Les schémas cognitifs sont des croyances ancrées profondément qui reflètent notre vision simplifiée du monde. Ils se construisent dès l'enfance et se façonnent au gré de notre évolution. Ils s'activent pour nous guider face à des situations plus ou moins familières. Lorsqu'ils s'activent trop fréquemment, trop intensément, qu'ils sont trop réducteurs, ces schémas peuvent devenir dysfonctionnels et handicapants, notamment dans la dépression.



# LA DÉPRESSION

## STRATÉGIES DE RÉGULATION ÉMOTIONNELLE

À l'instar de nombreux troubles psychiatriques, la dépression s'accompagne d'une difficulté à contrôler ses émotions et, par extension, ses pensées et ses comportements. La douleur provoquée par ces réactions émotionnelles, ces mauvaises pensées et les attitudes associées nous incite fréquemment à recourir à des stratégies de régulation. Certaines d'entre-elles ne sont pas aussi bénéfiques qu'elles en ont l'air.

### 2 TYPES DE STRATÉGIES INTUITIVES MAIS CONTREPRODUCTIVES

| Je ne veux plus souffrir                                                       |                                                                           |                                                                           |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Je veux me contrôler                                                           |                                                                           | Je veux m'analyser                                                        |                                                           |
| ÉVITEMENT & SUPPRESSION                                                        |                                                                           | RUMINATION                                                                |                                                           |
| J'arrête d'exprimer les émotions qui font mal                                  | J'arrête de penser à ce qui fait mal                                      | Je me concentre sur mes <b>sentiments</b> négatifs                        | Je me concentre sur les <b>causes</b> de ma douleur       |
| J'évite les situations qui me font mal<br>ex. les activités et les gens        | J'utilise ce qui <b>calme vite</b> la douleur<br>ex. alcool et substances | Je me concentre sur la <b>signification</b> de ma douleur                 | Je me concentre sur les <b>conséquences</b> de ma douleur |
| Ça me soulage à court terme car                                                |                                                                           |                                                                           |                                                           |
| J'ai l'impression de <b>maitriser</b> mes émotions et mes pensées douloureuses |                                                                           | J'ai l'impression de <b>comprendre</b> et de pouvoir régler mes problèmes |                                                           |
| Mais ça entretient la dépression car                                           |                                                                           |                                                                           |                                                           |
| J'arrive de moins en moins à tolérer la douleur                                |                                                                           | Je n'arrive toujours pas à prendre de décisions ni à agir                 |                                                           |

### 4 STRATÉGIES UTILISÉES EN PSYCHOTHÉRAPIE

| ACCEPTATION                                                                                                                                           | RESTRUCTURATION COGNITIVE                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accueillir et recevoir de façon active</b> (≠résignation) les émotions et les pensées douloureuses.<br>(repérage, curiosité, distanciation etc.)   | <b>Réinterpréter de façon plus rationnelle</b> les événements survenus au cours d'une situation stressante.<br>(auto-enregistrement, examen de l'évidence, décentration etc.)              |
| RÉSOLUTION DE PROBLÈME                                                                                                                                | ACTIVATION COMPORTEMENTALE                                                                                                                                                                 |
| S'orienter <b>vers le changement d'une situation</b> et non directement vers un soulagement émotionnel rapide.<br>(brainstorming, planification etc.) | Augmenter l'engagement dans des activités associées aux sentiments de <b>plaisir</b> et d' <b>efficacité personnelle</b> .<br>(activités sociales, physiques, loisirs, apprentissage etc.) |