

Perte de vue – amaurose

Anamnèse

- Caractérisation de la cécité
 - Localisation
 - Chronologie
 - Condition de survenue
 - Développement : subit-progressif
 - Perte de connaissance associée
- Céphalée associée ?
 - Localisation
 - Irradiation
 - Qualité
 - Chronologie
 - Circonstance de survenue
 - Début
 - Évolution
 - Intensité
 - Facteur soulageant – empirant
- Anamnèse par système neurologique
 - Diplopie
 - Perte de force
 - Perte de sensibilité
 - Paresthésie
 - Vertiges
- Anamnèse par système générale
 - Fièvre
 - Sudations nocturnes
 - Perte de poids
- Habitudes
 - Tabagisme
 - Alcool
 - Drogue
- ATCD et comorbidité
 - Maladie
 - Opération
 - Hospitalisation
 - Allergies
 - Médicaments

AVC URGENCE

- **Paralysie du visage**
- **Paralysie du bras ou jambe**
- **Trouble de la parole**
- **Trouble de la vue**
- **Vertiges violents**
- **Maux de tête intense**

Examen clinique :

- Ophtalmologique
 - Inspection
 - Sclère
 - Paupière
 - Acuité visuelle
 - Œil droit – gauche
 - Fond d'œil
- Neuro-ophtalmologique
 - Champs visuels
 - Poursuite oculaire – oculomotricité
 - Réflexes pupillaires
 - Direct
 - Croisé
- Neurologique
 - Motricité
 - Sensibilité
- DD AVC : test de Cincinnati
 - Motricité de la face NII
 - Épreuve des bras tendus
 - Répétition d'une phrase
- DD horton
 - Percussion de l'artère temporale
 - Palpation de la mâchoire
- Cardiaque
 - Auscultations carotide
 - Auscultation des 4 foyers

Glaucome : œil rouge, douleur, mal à la tête, halo autour des lumières, pert en périph

Décollement rétine : éclairs,

DMLA : metamorphosis,

Décollement du vitré : mouches qui volent

cataracte : voit moins les couleurs vives, vision trouble, perte du réflexe rouge, éblouissement

Differential diagnosis of vision loss		
Condition	Clinical features	Fundoscopy
AMD	• May be insidious (dry AMD) or rapid (wet AMD) onset • Impairment of central <u>vision</u> only (vision loss is rare)	• <u>Drusen</u> • <u>Macula</u> depigmentation
<u>Open-angle glaucoma</u>	• Insidious onset • Peripheral vision loss (tunnel <u>vision</u>)	• Disc cupping with high intraocular pressure
<u>Central retinal artery occlusion</u>	• Acute or subacute onset • Complete <u>vision loss</u>	• Swollen disc • Retinal hemorrhages • <u>Cotton wool spots</u>
<u>Retinal detachment</u>	• Acute onset • Partial or complete <u>vision loss</u> (falling curtain)	• Detached or floating <u>retina</u>
Cataract	• Insidious onset • Blurred, dim <u>vision</u>, and a glare • Absent or opacified red-reflex	• <u>Retina</u> may not be visible (in advanced disease)