



- 1. Nitrés**
- **Courte durée :**
 - Pour épisodes aigus (spray, comprimé, capsule)
 - **Longue durée (LAN) :**
 - Traitement de fond (patch ou comprimé retard)

- 1. Nitrés**
- Donneur de **monoxyde d'azote** =>
 - Vasodilatation veineuse, artérielle et artériolaire
1. Abaissement de la **précharge** → consommation réduite O₂
2. Diminution de la **R périphérique** → baisse de la tension pariétale du VG → consommation réduite d'O₂
3. Effet coronaro-dilatateur **direct** → baisse des R coronaires

- 2. Beta-bloquant (BB)**
- Diminution des effets agonistes des catécholamines (augmentation de la FC, du débit cardiaque, de la force de contraction et de la pression artérielle). **Cible : 55-60 bpm**
1. Diminution FC & **contractilité** → consommation réduite d'O₂
2. Diminution de la **R périphérique** → baisse de la tension pariétale du VG → consommation réduite d'O₂

3. Anti-calciques (CCB)

	Dihydropyridine DHP	Non-dihydropyridine Non-DHP
Représentant type	amlodipine	diltiazem, vérapamil
R. vasc. systémiques	↘	↘
Inotropisme	=	↘
FC	=	↘

- 3. Anti-calciques (CCB)**
- Empêchent l'influx transmembranaire de calcium dans les cellules myocardiques et les cellules musculaires lisses.
1. Relaxation directe de la **musculature lisse** des vaisseaux → consommation réduite d'O₂
2. (Diminution FC → consommation réduite d'O₂)

- 5. Nicorandil**
- Relaxation musculature lisse des vaisseaux veineux et artériels :
 - Ouverture canaux K → hyperpolarisation cellules musculaires lisses → vasodilatation artères coronaires et périphériques
 - Groupe nitrate → vasodilatation veines + artères
1. Abaissement de la précharge → consommation réduite O₂
2. Diminution de la R périphérique → baisse de la tension pariétale du VG → consommation réduite d'O₂
3. Effet coronaro-dilatateur **direct** → baisse des R coronaires

- 6. Ranolazine**
- Inhibition du courant sodique tardif → réduction de l'accumulation du sodium intracellulaire → diminution de la surcharge calcique intracellulaire.
1. Diminution de l'**inotropisme** («tonic contractures») → consommation réduite O₂

Tableau de comparaison des médicaments anti-angineux

	BB	CCB	Nicorandil	Ranolazine	LAN	BB+CCB	BB+LAN	CCB+LAN	Nicorandil+Ranolazine	LAN+Ranolazine
1 ^{er} step	BB ou AC	BB ou AC non-DHP	AC DHP	BB	BB à faible dose ou AC non-DHP à faible dose	BB et AC DHP	BB et AC non-DHP	LAN	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug
2 nd step	BB et AC DHP	BB et AC non-DHP	LAN	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	BB et AC DHP	BB et AC non-DHP	LAN	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug
3 rd step	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug
4 th step	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug	Add 2nd line drug

