

Epilepsie

Crise: BZD: Clonazepam RIVOTRIL
Lorazepam TEMESTA
Diazepam VALIUM

long terme: - focal: Lamotrigine, Lévetiracetam
- généralisée: Valproate, Lamotrigine
- absence: Éthosuximide

Crises épileptiques = phénomènes = mouvements, sensations, comportement.
- Début focal/généralisé/inconnu = expression clinique de l'écoulement élect. paroxysmique anormal
- Avec perte de contact ou non → absence
- Avec signes moteur ou non moteur → tonique-clonique
- myoclonique

Crise spécifique
- Prodrome stéréotypé
- Sémiologie < 1 minute → focal (30s - 2min)
- Phase post-critique variable → Todd
- morsure latérale, cyanose, perte d'urine
- Yeux très ouverts et rétrofléchés

Syncope
Prodrome: Lipothymiques
15 sec - 1 min
Phase post-critique
mouvements anormaux, pâleur
Yeux ouverts

Etat de mal épileptique EME = crise > 5 minutes
Mortalité +++ (30-20%)
BZD i.v. ou i.m. rapidement (aux urgences)

Crise non-épileptique psychogène PNES
Début flu, progressive, polymorphe
Épisodes prolongés → DD: État de mal
Yeux fermés résistants à l'ouverture

Epilepsie = 1 crise + risque récurrence > 60% / 10 ans (imagerie, EEG, génétique)
ou > 2 crises non provoquées (Mono → BZD → Trt tt → Chir.)

MAC = Médicaments anticonvulsivants


→ focal ou GTC → Spectre étroit = tous les MAC (sauf ESM) = Phénytoïne, Carbamazépine, VPA
→ génétique (GTC, myoclonique, absence) → Large spectre = Valproate, BZD (Lorazepam), ESM, PB
→ Maladie: Lamotrigine, Topiramate, Lévetiracetam, Zonisamide, Perampanel, Brivaracetam
→ Nouveaux: Bep, Lamotrigine, Topiramate, Lévetiracetam, BZB
Effet: efficacité, tolérance, (+ others)

Pharmacotherapy for epilepsy		
Seizure type	First line	Second line
Focal	- Lamotrigine <i>Lamictal</i> - Levetiracetam <i>Keppra</i> - Phenytoin - Carbamazepine - Oxcarbazepine - Phenobarbital (children)	- Gabapentin - Valproate - Pregabalin - Topiramate
	- Lamotrigine <i>Lamictal</i> - Valproate - Phenobarbital (children)	- Carbamazepine - Zonisamide
Generalized	- Ethosuximide - Valproate	- Lamotrigine - Clonazepam
	- Valproate - Lamotrigine - Topiramate	- Clonazepam - Felbamate



hyperkinesia

Phenomenon	Definition
parkinsonism	<i>lenteur + tremblement à repos</i> <i>(obligatoire)</i> <i>ou rigidité</i> <i>ou les 2</i> Akinesia +/- rigidity or rest tremor + <i>symptômes non moteurs:</i> <i>- apathie</i> <i>- dépression</i> <i>- fatigue ...</i> <i>lenteur</i> <i>= bradykinésie</i> <i>vasculaire, neuroleptiques</i>
ataxia	<i>sans ordre, contrôle</i> Literally "without order": loss of full control of bodily movements, which become clumsy and irregular due to decreased coordination <i>Etiologie +++</i>
dystonia	<i>tr. des tonus: contractions musculaires continues → postures anormales</i> sustained muscle contractions, frequently causing twisting and repetitive movements or abnormal postures <i>tr. de la tonus: contractions musculaires continues → postures anormales</i> <i>Δ DRD = Dopa-response dystonia → LEVODOPA!</i> <i>Héréditaire, toxopathique, neuroleptiques</i>
tremor	<i>oscillation rythmique autour d'un axe</i> <i>- Repos = Parkinsonien</i> <i>- Action = T. essentiel</i> <i>- Bilat.</i> <i>- Mains et avant-bras</i> <i>- B signes d'autres maladies neuro.</i> Rhythmic oscillation around an axis/joint <i>(- Proximal (B-B))</i> <i>(- Topiramate (anti-épi.) → DBS)</i>
Chorea	<i>sauve, imprédictible, au hasard</i> <i>(ballism, athetosis)</i> brief, abrupt, irregular, unpredictable (random), non-stereotyped movements <i>- Inf. striopallidaires</i> <i>(→ dyskinésies) - 84p, gène HTT = répétition trip</i> <i>SAAP, Diabète, L-Dopa, Neuroleptiques</i> <i>longueurs</i>
Myoclonus	<i>mité brève, soudaine</i> <i>+ = contraction</i> <i>- = inhibition</i> <i>= asterixes = flopping tremor</i> Sudden, brief, shock-like involuntary movement caused by muscular contraction or inhibition <i>Toxique +++</i> <i>Métabolique ++ : IR ou I. hépatique</i> <i>ttt de la cause</i> <i>Encéphalopathies</i>



Glutamate
GABA
Dopamine

