




[illegible]

Principaux effets α et β périphériques des catécholamines



		Récepteurs α		Récepteurs β		
		$\alpha 1$	$\alpha 2$	$\beta 1$	$\beta 2$	$\beta 3$
Affinité		Noradrénaline > Adrénaline > Isoprénaline		Isoprénaline > Adrénaline > Noradrénaline		
Protéine G		Gq	Gi	Gs		
Localisation		Muscles lisses	Ilots de langerhans	Rein Coeur	Muscles lisses	Tissu adipeux
Action	Dans la synapse	Post-synaptique principalement	Pré-synaptique principalement		Pré-synaptique	Post-synaptique
	Type	Excitateurs	Rétrocontrôle négatif : Inhibiteurs sur la libération de NAD/AD	Excitateurs	Rétrocontrôle positif : Excitateurs sur la libération de NAD/AD	- Inhibiteurs sur les muscles lisses - Sauf sur le cœur : Excitateurs
Effets		Contraction des muscles lisses	Relâchement des muscles lisses	Contraction des muscles lisses	- Relaxation des muscles lisses - Contraction cardiaque	- Glycogénolyse
Cas particulier		Dans les vaisseaux : Noradrénaline			Dans les vaisseaux : Adrénaline	



Reflexe Bicipital

Stimulation : percussion du tendon du biceps au pli du coude

Réponse : flexion du coude

Racine : C5 – C6

Reflexe stylo-radial

Stimulation : Percussion du processus styloïde du radius

Réponse : flexion du poignet

Niveau racine : C5 – C6 – C7

Reflexe cubito-pronateur

Stimulation : percussions du processus Styloïde de l'Ulna

Réponse : ébauche de pronation

Racine : C8

Reflexe rotulien

Stimulation : percussion du ligament patellaire

Réponse : extension du genou

Racine : L3 – L4

Reflexe Achilléen

Stimulation : percussion du tendon achilléen



Réponse : flexion plantaire du pied

Racine : S1 – S2

Réflexe tricipital

Stimulation : percussion du tendon du triceps au dessus du coude, le coude fléchi, paume tournée vers le corps

Réponse : extension du coude



Infarct, surface	Infarct, coronal section	Clinical manifestations
		Broca aphasia (if on left side) Contralateral hemiplegia, hemisensory loss, gaze palsy, spatial neglect
		Wernicke aphasia (if on left side) Contralateral hemianopia or upper quadrantanopia Constructional dyspraxia (if on right side)
		Global aphasia (if on left side) Contralateral gaze palsy, hemiplegia, hemisensory loss, spatial neglect, hemianopia May lead to decreased consciousness and even coma secondary to edema

