

## FORCE

L'étudiant·e doit commencer par une observation et une palpation de la masse musculaire

Pour le testing de la force contre résistance. On doit clairement vous demander :

- en premier lieu de vous mettre dans la position adéquate
- en second lieu de résister à la force de l'étudiant·e.

L'étudiant·e doit expliquer ce qui est fait et quel muscle est testé

Les gestes doivent être adaptés et proportionnels (la force d'un bras face à un bras, éventuellement plus si c'est une femme face à un homme, un doigt par rapport à un doigt etc.) Vérifier que l'étudiant·e est à l'aise dans sa posture quand il/elle fait un test. Lorsqu'on teste droite et gauche séparément, l'étudiant doit faire le testing avec son bras dominant.

Légende :      flèche verte : mouvement du patient  
                 flèche bleue : mouvement du médecin

## MEMBRES SUPERIEURS : LE PATIENT EST ASSIS

### FORCE

#### Epreuve bras tendus

Paumes vers le ciel

Yeux fermés

Au moins 10 secondes

#### Abduction du bras (Deltoïde, C5)

Eventuellement bras pliés

#### Rotation latérale épaule (muscle sous-épineux, C5)

Coudes le long du corps

bras pliés

mouvement des avant-bras vers l'extérieur

#### Flexion coude (muscle biceps, C5, C6)

Paume vers le ciel

(Si pouce vers le haut, c'est le muscle brachio-radial qui est testé, l'étudiant·e doit l'annoncer)



**Extension coude (muscle triceps, C7)**

Le point de résistance se fait sur le dos de la main ou le poignet

**Flexion poignet**

(muscles fléchisseurs du carpe, C7, C8)

Mouvement du poignet vers la paume  
Le bras doit être immobilisé

**Extension poignet**

(muscles extenseurs du carpe, C7)

Mouvement du poignet vers le dos de la main. Le bras doit être immobilisé. CAVE doigts tendus.

**Abduction des doigts**

(muscles interosseux, C8, T1)

Doigts écartés, le test se fait à la base des doigts

**Flexion des doigts (C8, T1)****Extension métacarpophalangienne (C7)**

## MEMBRES INFÉRIEURS : LE PATIENT EST COUCHE

Les muscles de la jambe se testent avec la main dominante (droite pour les droitiers...)

### FORCE

#### Epreuve jambes fléchies

Angle à 90°

Les pieds ne se touchent pas

Au moins 10 secondes



#### Flexion hanche

(muscle psoas, L2, L3)

Le point d'appui se fait sur le genou



#### Extension hanche

(muscle grand fessier, S1)

Jambe tendue, une main sous le genou (au creux du genou) ou sous le pied, le patient pousse la jambe vers le bas



#### Flexion genou

(muscles ischio-jambiers, L5, S1)

Plier le genou / ramener le pied vers la fesse



#### Extension genou (quadriceps, L3, L4)

Une main sous le genou et tendre la jambe






**Flexion dorsale / extension du pied  
(muscle tibial antérieur, L4, L5)**

Les 2 pieds en même temps,  
le corps doit glisser sur la table  
d'examen




**Extension gros orteil (L5)**

Comme pour les doigts de la main.  
A tester avec un doigt



**Flexion du gros orteil (S1)**

Comme pour les doigts de la main.  
A tester avec un doigt



**Eversion du pied  
(péronier latéral, L5)**

Pieds en canard ou en V.  
La cheville doit être bloquée.  
Pousser le pied vers l'extérieur.



**Inversion du pied  
(tibial postérieur, L5)**

Pieds ramenés vers l'intérieur.  
La cheville doit être bloquée.  
Pousser le pied vers l'intérieur.



## REFLEXES

Le marteau frappe toujours un tendon et génère une réponse au niveau d'un muscle.

Il doit être demandé au patient d'être détendu. Si le muscle est contacté, le réflexe ne se déclenche pas.

En cas de difficulté à obtenir le réflexe, une manœuvre de facilitation (tirer sur les mains ou serrer les dents) doit être demandée

Les réflexes doivent être systématiquement testés de manière bilatérale.


Les tests se font allongé ou assis, là où c'est le plus facile pour l'étudiant d'obtenir une réponse.

### REFLEXES

#### Réflexe bicipital (C5, C6)

A l'intérieur du coude


L'étudiant-e doit protéger la zone réflexe avec son doigt.



#### Réflexe tricipital (C7)

Au dessus du coude.

L'étudiant-e peut protéger la zone réflexe avec son doigt.



#### Réflexe stylo-radial (C6)

Bord externe du poignet, côté pouce



### Réflexe rotulien (L3, L4)

Sous la rotule, sur le tendon rotulien



### Réflexe achilléen (S1)

Au-dessus du talon sur le tendon d'Achille  
L'étudiant-e doit tenir le pied en en dorsiflexion



### Réflexe cutané-plantaire

Le pied doit être détendu

*La dénomination « Babinski » = signe de Babinski est la réponse anormale (= orteils en extension) à ce test.*





## MARCHE

**Marcher normalement**

**Retour sur la pointe des pieds**

**Sur les talons**

**Retour sur une ligne, pieds collés l'un à l'autre**

**Sautiller sur un pied, puis sur l'autre**

**Debout bras tendus, pieds collés, yeux fermés, au moins 10 secondes**



## SENSIBILITE

Il doit être demandé au patient de fermer les yeux.

L'examen doit être fait de manière systématique, des deux côtés.

L'étudiant·e doit commencer par tester la sensibilité générale, pour déterminer un niveau sensitif, en partant des extrémités vers le ventre, en vérifiant que la sensibilité du patient est partout la même. Orteil/index des deux côtés.

### SENSIBILITE

**Tact global**

**Piqure global**


**Pallesthésie poignet**

Le diapason doit être posé sur un relief osseux




**Pallesthésie cheville**

Le diapason doit être posé sur un relief osseux



### Position doigt

Le doigt doit être attrapé par les côtés.  
Le patient doit être détendu.



### Position orteil

L'orteil doit être attrapé par les côtés.  
Le patient doit être détendu.

