

Examen du status mental chez l'enfant et l'adolescent

Composante de l'examen du status mental	Repérer	Exemple
Apparence physique	- Âge (réel et représenté) - Vêtements appropriés par rapport à l'âge	« Stéphanie est une fille de 9 ans agréable à voir, bien apprêtée, portant des vêtements adaptés, qui fait plus que son âge (environ 12 ans) »
Ouverture relationnelle avec le clinicien, et tolérance à la séparation avec le parent	- Contact visuel - Coopération et adhésion à l'évaluation - Comportement envers les parents et la fratrie	« Elle évite le regard mais coopère lors de l'évaluation »
Humeurs, émotions	Type d'affects, adaptés ou non au contexte (ex déprimé, irritable, joyeux)	« Stéphanie semble déprimée (ex pleurs, absence de plaisir, désespoir), a peu de variations d'humeur et décrit une humeur dépressive »
Anxiété	- Peurs - Phobies - Obsessions - Compulsions ou rituels - Difficultés de séparation	« Elle ne présente pas de syndrome dépressif ou anxieux évidents »
Psychomotricité (agitation, ralentissement, ou décharges psychomotrices)	- Tics, maniérismes - Agitation psychomotrice - Coordination	« On observe un ralentissement psychomoteur »
Contenu et forme de la pensée	- Hallucinations - Délires - Troubles de la pensée	« On observe un ralentissement de la pensée, mais elle reste cohérente. On ne retrouve pas d'hallucinations ou de délire. »
Langage et discours	- Aisance - Prosodie - Allure - Capacités linguistiques	« Son discours est approprié par rapport à son âge »
Fonctionnement cognitif global	- Vocabulaire approprié - Soif de savoir - Dessins appropriés	« Ses capacités cognitives semblent altérées et son vocabulaire en dessous de son âge »
Attention et concentration	- Attention - Concentration	« Se fatigue très vite et s'arrête vite de suivre les conversations »
Mémoire	- Court-terme - Long-terme	« Ne montre pas de difficultés de remémoration »
Orientation	Orientation dans le temps, le lieu, les personnes	« A une bonne orientation spatio-temporelle »
Capacités de jugement et insight	- Conscience du problème - Capacité à critiquer des situations hypothétiques - Attitude vis-à-vis de l'aide - Observance	« Le patient a conscience du problème, est demandeur d'aide et de traitement »
Evaluation du risque	- Idées noires, comportement suicidaire - Comportement auto-agressif - Pensées hétéro-agressives ou projet de nuire à autrui - Comportement à risque	« Pas de risque auto ou hétéro-agressif »

16.11.2020