

SKILLS ME

Vision :

- Vision de loin œil fermé
- Vision de près œil fermé
- Champs visuels yeux ouverts, œil fermé
- Ishihara (test couleurs)

Audition :

- Chuchotements (33, 27)
- Palpation (mastôïde, tête de la mandibule, tour de l'oreille)
- Inspection du tympan (otoscope)
- Test de Weber
- Test de Rinne

Vasculaire :

- Inspections (cicatrices, langue, mains, jugulaires, jambes et œdèmes)
- Fréquence cardiaque (pulmonaire)
- Auscultation des carotides
- Palpation des carotides
- Palpation des pouls (carotidiens, brachial, radial, cubital, fémoral (auscultation avant si besoin), poplité, malléole interne, pédieux)
- Tension artérielle (avec vérification de matériel)

Articulaire :

Epaule

- Inspection globale (cicatrices, symétrie, taille des muscles, etc)
- Palpation (sternum, articulation costo-claviculaire, les clavicules, le processus coracoïde, l'articulation gléno-humérale, scapula)
- Mouvements et mesure des angles (flexion, extension, abduction, adduction, rotation interne/externe, signe du pouce)
- Mesure de la force (à faire en même temps)

Genoux

- Marche (inspection générale des jambes)
- Palpation (signe du glacon, rotule)
- Mouvements et mesure des angles
- Mesure de la force
- Ligaments : mobilité des jambes
- Signe du tiroir
- Varus/Valgus inspection et mesure de la distance intermalléolaire ou intercondylienne

Status cardiaque :

- Inspections générales (cicatrice, langue, mains, jugulaires, jambes et œdèmes)
- Fréquence cardiaque (pulmonaire)
- Auscultation des carotides
- Palpation des carotides
- Palpation = frémitus, début de la trachée, pointe du cœur
- Auscultation : APTM – (Mitrale et Tricuspidale : avec cloche)
- Dédoublage de B2 (fermeture des valves aortiques et pulmonaires – A avant P)

Status pulmonaire :

- Inspections générales (cicatrice, langue, mains, jugulaires, jambes et œdèmes)
- Fréquence pulmonaire
- Auscultation des carotides
- Palpation des carotides
- Palpation de la cage thoracique, ampliation thoracique
- Ganglions (submentaux, autour du SCM, subclaviculaires, axillaires, (inguinaux))
- Percussion délimitation – comparaison (4,2)
- Auscultation bouche ouverte + auscultation trachée
- Idem assis 6,2 – palpation, percussion (6,2), auscultation

Status digestif :

- Demander au patient s'il a mal qq part
- Inspections générales (cicatrices)
- Auscultation des 4 quadrants avec membrane + auscultation de l'aorte avec cloche
- Percussion des 4 quadrants
- Palpation superficielle
- Palpation profonde + palpation de l'aorte
- Manœuvre de pression puis de relâchement
- Vérifier les signes d'appendicite (point de McBurney + demander au patient de relever sa jambe contre force)
- Percussion et délimitation du foie
- Percussion et délimitation de la rate
- Palpation du foie et de la vésicule biliaire (demander au patient de prendre une grande inspiration)
- Palpation de la rate
- Vérifier les hernies (d'abord superficiellement puis demander au patient de relever la tête)
- Percuter les reins avec patient assis
- Dire au patient qu'on est censé faire un toucher rectal

Status neurologique :

- Faire marcher le patient, normalement, sur les talons, sur la pointe des pieds

- Faire s'accroupir le patient, lui demander de s'asseoir sur une chaise, de se relever, faire le signe de Romberg (mains vers le haut)
- Avec patient allongé, tester la force des membres sup et inf
- Puis tester les différents réflexes (ostéotendineux et cutanés si demandé)
- Enfin tester la sensibilité ; toucher/piqué – proprioception (avec doigt et gros orteil plus haut ou plus bas) – grand diapason à poser sur les os de l'avant-bras et sur les malléoles
- Faire finalement marcher le patient en funambule